

**3. *Pellaea* Link [nom. cons.] \***

[*Pellaea* f. – *gr. pellaia* = sombría, negruzca. Por su pecíolo y raquis negruzcos]

Rizoma corto, rastrero, cubierto de páleas lineares. Frondes fasciculadas, divididas, con pecíolo negruzco, generalmente glabro; pinnulas coriáceas, pecioluladas, subtriangulares o pentagonales. Soros submarginales, confluentes en una línea, protegidos por un pseudoindusio continuo. Esporas triletas, tetraédrico-globosas,

**1. *P. calomelanos* (Sw.) Link, Fil. Spec.: 61 (1841)**

[Calomélanos]

*Pteris calomelanos* Sw. in J. Bot. (Schrader) 1800 (2): 70 (1802) [basión.]


*Ind. loc.*: [sec. Thunberg, Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica]

*lc.*: Lám. 18

Rizoma cubierto de páleas enteras, pardas, con una franja central negra. Frondes de hasta 30 cm, fasciculadas, con pecíolo rígido, negro brillante, glabro excepto en la base; lámina mayor que el pecíolo, 2-pinnada, de ovada a ovado-lanceolada; raquis negro brillante; pinnulas pecioluladas, coriáceas, glaucas, glabras, articuladas en la unión con el raquis, cordadas en la base, con 3-5 lóbulos agudos o subagudos. Soros formando una línea submarginal continua que circunda toda la pinnula, recubiertos por un pseudoindusio entero y membranáceo. Esporas con perisporio verruculoso.  $2n = 90$ .

Grietas y repisas de roquedos silíceos. VI-X. S de África, Etiopía, N de la India y NE de la Península Ibérica: La Cellera y Sant Llorenç de la Muga; subespontáneo en Macaronesia. **Esp.**: Ge.

\* F. Muñoz Garmendia



Lám. 18.—*Pellaea calomelanos*, El Pastoral, Gerona (BC 71723): a) hábito; b) envés de una pinna; c) haz de una pinnula; d) escamas del rizoma; e) escamas de la base del pecíolo; f) detalle del pseudo-indusio con esporangios; g) esporangios; h) esporas en vistas proximal y distal.