

1. Pteridium Gled. ex Scop. [nom. cons.] **

[Pteridium n. – gr. *pteris*, ver género *Pteris*; gr. *-ion*, sufijo de diminutivo]

Rizoma subterráneo, muy desarrollado, ramoso, con pelos pluricelulares marrón-oscuros. Frondes esparcidas; lámina 3-4 pinnada, con nervadura libre; pinna inferior con nectarios junto al raquis. Indusio doble, continuo, marginal; su parte externa es un pseudoindusio formado por el margen revoluto de la lámina; la interna, el verdadero indusio, es membranacea y tiene desarrollo variable. Esporas triletas, globoso-tetraédricas, de sublisas a finamente espinulosas, marrones.

Bibliografía.—C.N. PAGE in Bot. J. Linn. Soc. 73: 1-34 (1976); R.M. TRYON in Rhodora 43: 1-31, 37-67 (1941).

1. P. aquilinum (L.) Kuhn in Kerst., Reisen

[aquilínium]

Ost-Afr. 3(3): 11 (1879)

subsp. **aquilinum**

Pteris aquilina L., Sp. Pl.: 1075 (1753) [basión.]

P. herediae (Clemente ex Colmeiro) Barnola in Buttl. Inst. Catalana Hist. Nat. 11: 135 (1912)

Ind. loc.: "Habitat in Europae sylvis, praesertim caeduis"

Ic.: Lám. 29


Fronde 0,2-2 m, marcescentes; pecíolo subigual o menor que la lámina, erecto, rígido, canaliculado, de base ensanchada y con pelos pluricelulares marrón-oscuros, glabrescente en el resto; lámina de oblongo-ovada a deltoidea, de patente a erecta; raquis ± cubierto de pelos pluricelulares hialinos; pinnas

** F. Muñoz Garmendia

1. Pteridium

subpuestas, de ovado-deltaideas a oblongas, a veces subovadas; pínulas oblongas, obtusas o subagudas, glabrescentes en el haz, de subglabras a densamente cubiertas de pelos pluricelulares, hialinos o castaño-claros, en el envés. Pseudoindusio con márgenes anchamente membranáceos, ferrugíneos, y borde \pm densamente ciliado; indusio marrón, de borde ligeramente fimbriado. Esporas 28-36 microm, con perisporio verruculoso. $2n = 52, 104^*$; $n = 52^*$.

Bosques y sus etapas seriales; planta heliófila en suelo profundo y fresco, descalcificado, a veces en substrato calizo; prefiere las umbrías y barrancos en la zona mediterránea; 0-2000 m. VI-X. Subcosmopolita. Frecuente en el N de la Península y en las zonas montañosas del resto, para faltar en el SE y en las Pitiusas. **And. Esp.:** todas las provincias excepto Al Mu Va. **Port.:** todas las provincias. **N.v.:** helecho común, helecho hembra, falaguera, foguera; *port.:* feto-ordinário, feto-dos-montes, feto-fêmeadas-boticas, feitos; *cat.:* falguera, herba falaguera, falaguera; *eusk.:* iratze arrunta, garoa, garoizka, ira, ari, ide, idi, iñastor; *gall.:* fento común, fento, feito, felgo, fento femia.



Lám. 29.—*Pteridium aquilinum*, Cornellà del Terri, Gerona (BC 604228): a) hábito; b) pínulas por el haz; c) id., por el envés; d) detalle del envés de una pínula con el pseudoindusio parcialmente levantado; e) esporangio; f) espóra en vista proximal.