

XIX. THELYPTERIDACEAE *

Isospóreos, vivaces, herbáceos, rizomatosos. Soros en el envés de las frondes, de redondeados a lineares, con indusio generalmente reniforme o sin indusio. Esporangios esferoidales, con anillo longitudinal. Protalos epigeos, cordados, con clorofila.

Integrada por 32 géneros, con c. 900 especies, de distribución predominantemente intertropical, escasas en las zonas templadas.

Bibliografía.—R.E. HOLTUM in Blumea 19: 17-52 (1971).

1. Lámina deltoidea; pecíolo claramente mayor que la lámina; raquis de las pinnas no canaliculado; pinnas inferiores reflejas, iguales o mayores que las medianas **1. Phegopteris**
- Lámina de lanceolada a ovado-lanceolada; pecíolo menor o escasamente mayor que la lámina; raquis de las pinnas claramente canaliculado; pinnas inferiores no reflejas, menores que las medianas 2
2. Indusio hispido, eglanduloso **4. Christella**
- Sin indusio o con indusio glabro y glanduloso 3
3. Rizoma 10-15 mm de diámetro, con frondes fasciculadas; lámina con olor a limón; soros claramente marginales **2. Lastrea**
- Rizoma 2-3 mm de diámetro, con frondes esparcidas; lámina sin olor a limón; soros equidistantes del margen y del nervio medio de la pinnula 4
4. Planta escasamente pelosa; pinnulas con bordes revolutos; soros redondeados **3. Thelypteris**
- Planta pelosa; pinnulas con bordes no revolutos; soros lineares **5. Stegnogramma**

* S. Castroviejo (ed.)