

4. **Christella** H. Lév.*

[Christélla f. – Konrad Hermann Heinrich Christ (1833-1933), pteridólogo suizo]

Rizoma con páleas ovado-lanceoladas, acuminadas. Frondes esparcidas; pecíolo menor que la lámina, con páleas lanceoladas; lámina 1-pinnada, ovado-lanceolada; pinnas de 1-pinnatífidas a 1-pinnatipartidas, con raquis canaliculado y abundantes pelos aciculares en el envés o, a veces, con pelos recios y obtusos; pinnas inferiores sensiblemente menores. Soros con indusio reniforme, peloso exteriormente; pedículo del esporangio con pelos unicelulares, glandulosos.

1. **Ch. dentata** (Forssk.) Brownsey & Jermy in Brit. [dentáta]
Fern Gaz. 10: 338 (1973)


Polypodium dentatum Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 185 (1775) [basión.]

Thelypteris dentata (Forssk.) St. John in Amer. Fern J. 26: 44 (1936)

Ind. loc.: "... in montibus Yemen ad Bolghose"

Ic.: Lám. 33

* S. Castroviejo



l.ám 33.—*Christella dentata*, a) y f) Fernando Poo, Guinea Ecuatorial (BC 621331); b-e) Los Barrios, Cádiz: a) hábito; b) detalle de una pinna; c) id., por el envés; d) soro con el indusio; e) corte de un soro; f) espora.

5. Stegmogramma

Rizoma con páleas de hasta 10 mm de longitud, pardo-negruczas. Frondes c. 70 cm, pelosas en toda su superficie, con unos pelos cortos y otros de mayor longitud; pecíolo canaliculado; pinnas 15-25 pares, las medianas de 9-10 × 1,5-2 cm; pínulas con ápice redondeado. Soros sobre los nervios, orbiculares, equidistantes del margen y del nervio medio; indusio cubierto de pelos rígidos, blanquecinos. $2n = 72^*$, c. 80^* , 144^* ; $n = 72^*$.

Bordes de arroyo, en bosques. VI-IX. Regiones tropicales y subtropicales del Viejo Mundo, recientemente naturalizada en América. Sierras de Algeciras. **Esp.:** Ca.