

5. *Stegnogramma* Blume *

[*Stegnogramma* f. – gr. *stegnós* = cubierto; gr. *grammé* = línea. Según Blume, los soros alineados están desde el principio cubiertos por el indusio]

Rizoma corto, procumbente o erecto, páleas abundantes con cortos pelos unicelulares. Frondes en fascículos poco nutridos, a lo largo del rizoma, muy pelosas; pecíolo generalmente menor que la lámina; ésta 1-pinnada, ovado-lanceolada, no atenuada bruscamente en la base; pinnas 1-pinnatífidas, con el raquis canaliculado. Soros lineares, sin indusio, dispuestos a lo largo de las venas. Esporangios pediculados, subglobosos, con 2 netos cilios laterales.

1. **S. pozoi** (Lag.) K. Iwats. in Acta Phytotax. Geobot. [Pózoi]
29: 124(1963)

Hemionitis pozoi Lag., Elench. Pl.: 33 (1816) [basión.]

Thelypteris pozoi (Lag.) C.V. Morton in Bull. Soc. Bot. France 106: 34(1959)

Ceterach hispanicum auct.


Ind. loc.: “Habitat in Cantabriae provinciis...”

lc.: Lám. 34

Rizoma 2-3 mm de diámetro, con páleas lanceoladas, acuminadas, pardas. Frondes de tamaño muy variable, generalmente mayor de 15 cm; lámina con abundantes pelos unicelulares en ambas caras y especialmente en el raquis. Esporas elipsoidales, con perisporio equinado. $2n = 144^*$; $n = 72^*$.

Grietas de roquedos, oquedades y taludes, en lugares húmedos y abrigados; 0-600 m. I-VIII. Cornisa cantábrica. SW de Francia, Azores. Madeira, África austral, India, China, Japón y Corea.
Esp.: Bi O S SS Vi.

* S. Castroviejo



Lám. 34.—*Stegogramma pozoi*, Peñasal de Iturri-gorri, Bilbao, Vizcaya (MA 227279): a) hábito; b) detalle del envés de una pinna; c) soro; d) esporangio; e) espora.