


### 3. **Ceterach** Willd. [nom. cons.] \*

[Céterach n. – ár. (diversas grafías) *šātiray* = doradilla y otras plantas]

Rizoma corto, vertical, revestido de páleas lanceolado-acuminadas, clatradadas. Frondes fasciculadas; pecíolo corto, paleáceo; lámina gruesa, 1-pinnatipartida, glabra en el haz, densamente paleácea en el envés; nervadura dicótoma, anastomosada en los márgenes. Soros oblongo-lineares; indusio rudimentario o nulo. Esporas ovoideas, de simetría bilateral; perisporio equinulado-reticulado.

\* J. Ormonde



Lám. 38.—*Ceterach officinarum*, La Riba, Tarragona (BC 72834): a) hábito; b) detalle del envés de la lámina; c) íd., tras ser depilado; d) pálea de la lámina; e) pálea del rizoma; f) espora; g) esporangio.

**1. *C. officinarum* Willd., Anleit. Selbststud.**

[officinárum]

Bot.: 578 (1804)

subsp. ***officinarum****Asplenium ceterach* L., Sp. Pl.: 1080 (1753)

*Ind. loc.*: "Das gebräuchliche Ceterach wächst im südlichen Deutschland, in der Schweiz und Italien auf Felsen. Es wurde vormahls als ein Mittel den Gries und die Steine der Urinblase abzuführen gebraucht, und ist in Frankreich noch unter dem Nahmen Doradille im Gebrauch"

*lc.*: Lám. 38

Rizoma cespitoso, revestido de páleas negras con margen ciliado. Frondes (3)5-15(25) cm, persistentes, en fascículos densos; pecíolo 1/6-1/3 de la longitud de la lámina, generalmente castaño negruzco en la base; lámina (2,5)4-12(20) × (0,5)1,5-2(3) cm, de lanceolada a obovado-lanceolada, verde ± oscuro y mate en el haz, con páleas brillantes, de plateadas a ferrugíneas, en el envés; pinnas 8-10 × 4-6 mm, 6-15 pares, alternas, ovadas u oblongas, redondeadas en el ápice, enteras o crenadas. Esporas (30)36-45(46) µm de diámetro, castaño-negruzcas.  $2n = 144$ ;  $n = 72$ .

Grietas de roquedos y muros, preferentemente básicos, en lugares umbrosos; 0-2700 m. I-XII. W y C de Europa, región mediterránea y Asia templada. Casi todo el territorio peninsular y Baleares. (**And.**) **Esp.**: todas las provincias. **Port.**: todas las provincias excepto BA. **N.v.**: doradilla; *port.*: douradinha; *cat.*: dauradella, doradella; *eusk.*: xardin-belar horia, txarrangilla; *gall.*: dou-radiña.

## HÍBRIDOS

***Asplenium* × *Ceterach***× *Asplenoceterach* D.E. Mey.***Asplenium majoricum* × *Ceterach officinarum* subsp. *officinarum***× *Asplenoceterach barracense* Bennert & D.E. Mey. in Willdenowia 6: 463 (1972)