


#### **4. Diplazium Sw. \***

[Diplázium n. – gr. *diplázo* = ser doble. Por sus esporangios e indusios geminados, a ambos lados de los nervios]

Rizoma rastrero, con páleas dispersas, ovadas, castaño-oscuro, opacas, con paredes celulares engrosadas. Frondes esparcidas, erectas; lámina 3-pinnada,

\* Á.E. Salvo & P. Otermin



Lám. 44.—*Diplazium caudatum*: a) pinna; b) ápice de la fronde; c) base del pecíolo; d) detalle del envés de la lámina; e) soro con el pecíolo; f) espora.

4. *Diplazium*

con nervadura libre. Soros dispuestos a ambos lados de las venas; indusio oblongo, adherido lateralmente. Esporas monoletas, con perisporio generalmente alado.

1. *D. caudatum* (Cav.) Jermy in Brit. Fern Gaz. 9: 161 (1964) [caudátum]

*Tectaria caudata* Cav. in Anales Ci. Nat. 4(10): 100 (1801) [basi6n.]

*Ind. loc.*: "Se cria en los sitios h6medos de Tenerife"

*Ic.*: Lám. 44

Rizoma de hasta 40 cm. Frondes (50)70-150(190) cm; pec6olo m6s corto que la l6mina, dilatado en la base, negro brillante en su parte inferior, el resto de amarillo verdoso a plumizo, cubierto en la base de p6leas casta6o-oscuras, opacas; l6mina 25-50 cm de anchura, de ovada a ovado-lanceolada, verde oscura, glabra; pinnas anchamente ovado-lanceoladas, acuminadas o caudadas, el par basal m6s corto que el inmediato superior; p6nnulas agudas, con los segmentos de 6ltimo orden lobado-serrados, las proximales –al menos en las pinnas basales– m6s cortas que las vecinas. Soros oblongos. Esporas (22)26-36(41)  $\mu\text{m}$ .  $2n = 82^*$ .

Barrancos profundos, h6medos y umbrosos. V-XI. Regi6n macaron6sica y sierras de Algeciras.  
**Esp.**: Ca.