

1. *Davallia* Sm. *

[Davállia f. – Edmund Davall (1763-1798), botánico inglés establecido en Suiza]

Rizoma serpenteante, crasiúsculo, densamente cubierto de páleas de color castaño, peltadas en la base, a veces ciliadas. Frondes dísticas a lo largo del rizoma; pecíolo articulado en la base, con varios haces conductores; lámina varias veces dividida, de triangular a estrechamente ovada, coriácea, glabrescente o glabra, con nervadura libre. Soros apicales, submarginales, en el extremo de los nervios; indusio acopado. Esporas oblongo-reniformes, hialinas.

1. **D. canariensis** (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. [canariénsis]
Sci. (Turín) 5: 414 (1793)

Trichomanes canariensis L., Sp. Pl.: 1099 (1753) [basión.]


Ind. loc.: “Habitat in Canariis, Lusitania, ad latera montium”

lc.: Lám. 51

Rizoma 10-15 mm de diámetro, con páleas 10-12 × 2-3 mm, lanceoladas, brillantes, de margen hialino, ciliado. Frondes (10)12-50 × 10-30 cm; pecíolo de igual longitud que la lámina, castaño rojizo, paleáceo y castaño oscuro en la base; lámina 3-4 pinnada, subdeltoidea, glabra, con los segmentos de último orden lanceolados u ovado-oblongos, de color verde intenso, ± profundamente recortados. $2n = 80$.

Troncos y ramas de árboles, rocas musgosas, en lugares frescos y húmedos; 0-600 m. III-IX. Península Ibérica, Marruecos, Madeira y Canarias, Cádiz, W de Portugal al N del Tajo, Galicia y Asturias. **Esp.**: C Ca Lu (Ma) O Po. **Port.**: BL DL E Mi. **N.v.**: cabriña, pulipuli, cochinita; *port.*: cabrinha, fetos-dos-carvalhos, *gall.*: cabriña.

* J. Paiva (ed.) ** J. Paiva



Lám. 51.—*Davallia canariensis*, Sabaceda, Pontevedra (MA 198364): a) hábito; b) corte del rizoma; c) pálea del rizoma; d) detalle de la lámina con los soros; e) soro con indusio; f) espora; g) ápice de la fronde.