

## 1. *Blechnum* L.\*\*

[*Bléchnum* n. – gr. *bléchnon* = nombre de helechos, sinónimo de *pteris*]

Rizoma de oblicuo a erecto, a veces rastrero. Frondes generalmente dimorfas; lámina 1-pinnatipartida o 1-pinnatisecta, coriácea, glabra, con las pinnas enteras o crenadas, de nervadura libre en las frondes estériles y anastomosada en las fértiles. Soros lineares, formando cenosoros continuos, que en general ocupan casi la totalidad del envés de las pinnas; indusio consistente, linear. Esporas de elípticas a ovoideas, generalmente con perisporio rugoso.

### 1. **B. spicant** (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) [Spícant] subsp. **spicant**

*Osmunda spicant* L., Sp. Pl.: 1066 (1753) [basión.]

*Ind. loc.*: “Habitat in Europa”

*Ic.*: A. Fern. & R. Fern. (eds.), Icon. Selecta Fl. Azoricae 1, tab. 22 (1980) [var. *spicant*]; lám. 52 [var. *homophyllum*]

Rizoma grueso, oblicuo, corto, densamente revestido en el ápice de páleas linear-lanceoladas, castaño-oscuras. Frondes 8-70 × 3-7 cm, fasciculadas, heteromorfas –excepto en la var. *homophyllum*–, con 25-60 pares de pinnas; las estériles, ± persistentes en invierno, cortamente pecioladas, de lámina oblongo-lanceolada, atenuada en la base, y pinnas de 3-5 mm de anchura; las

\*\* J. Ormonde

2. **Woodwardia**

fértiles, marcescentes, poco numerosas, naciendo en la parte central del fascículo, largamente pecioladas, de lámina lanceolada y pinnas más espaciadas de 1-2 mm de anchura. Esporas ovoideas, de color castaño, con perisporio ligeramente rugoso.  $2n = 68$ ;  $n = 34^*$ ;  $2n = 68$  (var. *homophyllum*).

Zonas húmedas y umbrosas, en suelos ácidos; 0-2200 m. IV-IX. Europa, Islandia, N de África, Macaronesia (excepto Cabo Verde), Asia Menor y Cáucaso. **N.v.:** lonchite, lonquite; **cat.:** blècnium; **eusk.:** orrazi-iratzea; **gall.:** fenta, blechno.

1. Frondes heteromorfas, de (15)20-70 cm; las estériles, arqueadas; las fértiles, erectas; pinnas de las frondes fértiles relativamente espaciadas, casi totalmente cubiertas por los cenosoros ..... **a<sub>1</sub>** var. **spicant**
- Frondes homomorfas, de 8-20(30) cm, ± erectas; pinnas de las frondes fértiles aproximadas, generalmente con solo una pequeña parte cubierta por los cenosoros ..... **a<sub>2</sub>** var. **homophyllum**

**a<sub>1</sub>** var. **spicant**


Provincia atlántica, montañas silíceas del interior, Algarve, sierras del Aljibe y Aracena, extinta en Mallorca. **And. Esp.:** Av B Ba Bi (Bu) C Ca Cc CR Cu Ge (Gu) H Hu L Le Lo Lu M Na O Or (P) PM[(Mll)] Po S Sa Sg So SS (Te) To Vi Z Za. **Port.:** todas las provincias excepto BAI.

**a<sub>2</sub>** var. **homophyllum** Merino ex H. Christ in Bull. [homophýllum]  
Acad. Int. Géogr. Bot. 13(172): 79 (1904)

*B. spicant* subsp. *homophyllum* (Merino ex H. Christ) Merino, Fl. Galicia 3: 488 (1909)

*B. homophyllum* (Merino ex H. Christ) Samp. in Anais Fac. Ci. Porto 19: 66 (1934)

● NW de la Península. **Esp.:** C Po. **Port.:** DL Mi.



Lám. 52.—*Blechnum spicant* var. *homophyllum*, La Guardia, Pontevedra (MA 152390): a) hábito; b) detalle del envés de la lámina; c) detalle del envés de una pinna con soros; d) esporas.