

#### **4. Larix Mill.\***

[Lárix f. – lat. *larix* = alerce, lárice]

Árboles caducifolios, de ramificación irregularmente verticilada; con macro y braquiblastos. Hojas caducas, lineares, generalmente finas, blandas, dispuestas

\* J. do Amaral Franco

**5. Cedrus**

principalmente en fascículos en la terminación de los braquiblastos. Estróbilos erectos, de maduración anual, pequeños (menores de 4,5 cm), con escamas persistentes, las tectrices inclusas o exertas, las seminíferas con semillas aladas.

Con *L. × eurolepis* A. Henry in Proc. Roy. Irish Acad. 35 B: 60 (1919) [*L. decidua* Mill. × *L. kaempferi* (Lamb.) Carrière], o con alguna de sus especies parentales, se han ensayado recientemente plantaciones forestales en el N de España (Bi Hu Na S SS Vi). Árbol de crecimiento vigoroso, con ramillas (brotes del año) rojizo-acastañadas, poco pruinosas; hojas de los macroblastos con 5-7 hileras de estomas en cada banda del envés; estróbilos con escamas tectrices exertas y seminíferas con el ápice recurvado. **N.v.:** alerce japonés; *cat.:* làrix del Japó; *eusk.:* alertzei japoniarra. *Ic.:* Lám. 57g. Hay plantaciones locales y más antiguas de **L. decidua** [*Pinus larix* L.] Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768), en el Sistema Central (M Sg), que tiene ramillas no pruinosas y escamas seminíferas con ápice no recurvado. **N.v.:** alerce, lárice; *port.:* lariço; *eusk.:* alertzea. *Ic.:* Lám. 57h-i.