XXIX. CUPRESSACEAE *

Árboles, raramente arbustos, monoicos o dioicos, resinosos. Hojas opuestas o verticiladas. Conos con escamas opuestas o verticiladas; los masculinos, con 3-7 sacos polínicos por escama; los femeninos, con escamas concrescentes, planas o peltadas y 2-24 rudimentos seminales por escama. Fructificaciones carnosas (gálbulos) o leñosas (gálbulos leñosos o estróbilos).

Integrada por 21 géneros y c. 130 especies repartidas por los hemisferios N y S.

| | Hojas adultas aciculares; plantas dioicas |
|----|--|
| | noicas dioicas |
| 2. | Fructificaciones carnosas, bacciformes, indehiscentes (gálbulos); plantas monoicas o |
| | dioicas |
| _ | Fructificaciones leñosas, dehiscentes (estróbilos); plantas siempre monoicas 3 |
| 3. | Estróbilos con 4 escamas a modo de valvas, verticiladas; hojas en verticilos de 4 |
| | 4. Tetraclinis |
| _ | Estróbilos con 6 o más escamas; hojas decusadas |
| 4. | Ramillas redondeadas o cuadrangulares, no dispuestas en un solo plano; estróbilos de |
| | 1-4 cm, con más de 5 semillas por escama |
| _ | Ramillas comprimidas, dispuestas en un plano; estróbilos de hasta 1,3 cm, con 1-5 |
| | semillas por escama |
| 5. | Escamas del estróbilo ± planas, a modo de valvas |
| _ | Escamas del estróbilo peltadas |
| | |

^{*} G. López González (ed.)