

2. **Callianthemum** C.A. Mey.*

[Calliánthemum n. – gr. *calli-(cállos)* = hermosura; gr. *ánthemon* = flor]

Hierbas vivaces, rizomatosas. Hojas 2-3 pinnatisectas; las basales, en roseta, desarrolladas antes o después de la antesis, de pecíolo envainador; las caulinares, alternas. Flores actinomorfas, blancas o rosadas, generalmente solitarias.

* G. López González

3. *Nigella*

Perianto formado por 2 envolturas; la externa, de 5 piezas (sépalos) membranosas; la interna, de 5-15(20) piezas (pétalos) libres, mayores que las externas, con fosa nectarífera desnuda o con escama rudimentaria linguliforme. Carpelos numerosos, libres, con 1 rudimento seminal colgante, anátropo. Receptáculo hemisférico, glabro, que no se alarga en la fructificación. Fruto en plurifolículo; folículos monospermos, estipitados, indehiscentes, no comprimidos, atenuados en pico, que semejan aquenios.

Bibliografía.—J. WITASEK in Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 49: 316-356 (1899).

1. *C. coriandrifolium* Rchb., Fl. Germ.

[coriandrifólium]


Excurs.: 727 (1832)

Ind. loc.: “Am Rande der Gletscher auf Urgebirgsalpen, in Unterkärnten auf der Pasterze: ... Schweiz im Wallis und in Graubünden, auf dem M. Septimo, Oberstafel und M. Moron. Hall. am Schwarzsee und auf dem M. Röfel über Zermatten: ... auf den Höhen des Baldo seit Pona, bes. in der Valle del bastion, Costa bella, Coval santo, la valle di Mon maor nach Pollini, Piemont, Novarese”

lc.: Lám. 72

Glabra, glauca, de hasta 20(30) cm. Rizoma vertical u oblicuo, con raíces cilíndricas, fibrosas. Tallos erectos o ascendentes, generalmente solitarios, simples. Hojas basales 2(3)-pinnatisectas, largamente pecioladas, desarrolladas en la anthesis; lámina 15-60 × 8-35(40) mm, ovada; segmentos ovados u orbiculares, muy divididos, con lóbulos de oblongo-lanceolados a obovados. Hojas caulinares 1-2, semejantes a las basales aunque menores; la superior, subsésil. Flores solitarias, de hasta 25(30) mm de diámetro. Pétalos 6-13, obovados u oblongos, escotados, crenados o enteros, blancos, anaranjados en la base. Receptáculo hemisférico, glabro. Folículos 3,5-4 mm, ovoides, rugulosos, estipitados, no comprimidos, atenuados en pico corto. $2n = 16^*$.

Pastos junto a neveros en substrato calizo; 1500-2200 m. VI-VII. Alpes, Cárpatos, Bosnia, Pirineos franceses y Cordillera Cantábrica. Peña Ubiña. **Esp.:** Le O.



Lám. 72.—*Callianthemum coriandrifolium*, Peña Ubiña, León (Herb. Laínz): a) hábito; b) segmento foliar; c) flor; d) pétalo y sépalo; e) estambre; f) plurifolículo; g) folículos en vistas dorsal y lateral.