

7. *Actaea* L.*

[Actáea f. – gr. *aktaía* = actea // costera]

Herbáceas, vivaces, glabras. Hojas divididas. Inflorescencia en racimo. Flores actinomorfas. Perianto formado por 2 envolturas caducas, blancas; la externa, de 3-5 piezas (sépalos) libres, petaloideas; la interna, de 4-10 piezas (pétalos) libres, espatulado-unguiculadas, planas. Pistilo unicarpelar, con estigma sésil. Fruto bacciforme, polispermo.

1. *A. spicata* L., Sp. Pl.: 504 (1753)

[spicáta]

Ind. loc.: “Habitat in nemoribus Europae”


lc.: Lám. 78

Rizoma grueso, nudoso; raíces fibrosas, de hasta 30 cm. Tallo 30-65 cm, erecto, simple o poco ramoso, desnudo en la base. Hojas inferiores de hasta 40 cm, 2-3 pinnatisectas, de contorno subtriangular; segmentos ovado-lanceolados, el terminal trifido, todos ellos irregularmente inciso-dentados, de un verde brillante por el haz y glaucescentes por el envés; hojas caulinares 1-3, menores que las basales. Racimo denso en la anthesis y laxo en la fructificación, con pedúnculo de 3-10 cm. Sépalos de hasta 5 mm, ± escotados. Pétalos 3-5 mm, ± bífidos. Estambres 6-9 mm. Bayas de hasta 12 mm, oblongas, negras al madurar, sobre pedúnculos subiguales, patentes. Semillas c. 4 × 2-2,5 mm, subtrígonas o tetragonas, plano-convexas, parduscas, algo rugosas, suavemente carinadas en los ángulos. $2n = 16^*$; $n = 8^*$.

Bosques húmedos, dolinas kársticas, etc.; nitrófila, preferentemente esciófila, indiferente al substrato; 700-2200 m. IV-VII. Eurasia. Mitad N peninsular. **And. Esp.:** Av B Bu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O (Or) P S Sa So Te Za. **N.v.:** yerba de San Cristóbal, cristoforiana, cristobalina; *cat.:* herba de Sant Cristòfol.

Planta venenosa, de frutos y raíces purgantes.

* L. Villar



Lám. 78.—*Actaea spicata*, Peña de Oroel, Huesca (BC 93815): a) hábito; b) botón floral; c) flor; d) sépalo; e) pétalo; f) estambre; g) frutos; h) semilla.