


## 8. *Caltha* L.\*

[*Caltha* f. – lat. *caltha* = nombre de planta. En Plinio, según los antiguos, una caléndula]

Herbáceas, vivaces o perennantes, glabras. Hojas simples, estipuladas, acorazonadas. Flores actinomorfas, en cimas corimbosas paucifloras. Perianto con

\* L. Villar



Lám. 79.—*Caltha palustris*, Olot, Gerona (BC 01575): a) hábito; b) receptáculo con androceo y gineceo; c) plurifolículo maduro.

una sola envoltura de 5 piezas (sépalos) petaloideas, doradas. Estambres numerosos, más cortos que los sépalos. Gineceo con 4-15 carpelos verticilados y soldados en su mitad inferior. Fruto en plurifolículo, glabro.

**1. C. palustris L., Sp. Pl.: 558 (1753)**

[palústris]

*Ind. loc.:* "Habitat in humidiusculis Europae"

*lc.:* Lám. 79

Raíces de hasta 20 cm, fasciculadas, engrosadas. Tallos 15-50 cm, postrado-radicantes, ascendentes o erectos,  $\pm$  brillantes, asurcados y fistulosos. Hojas basales cordiformes, crenadas o dentadas, con pecíolo 10-20(42) cm y limbo 3-10(15) cm; las caulinares medias, con pecíolo 1-3 cm; las superiores, sésiles o casi, reniforme-subtriangulares. Flores 2-5 cm de diámetro, pediceladas. Sépalos 15(20)  $\times$  10(18) mm, redondeados o romboidales, parcialmente solapados, con nervios marcados, oscuros en el haz y verdosos en el envés. Folículos 10-15 mm, erectos o erecto-patentes, sésiles, con el dorso  $\pm$  recto y prolongado en pico corto (2,5-3 mm), glabros; dehiscencia ventral. Semillas c. 2,5  $\times$  1 mm, fusiformes, negras, rugulosas.  $2n = 16^*$ ,  $28^*$ ,  $32^*$ ,  $35^*$ ,  $44^*$ ,  $48^*$ ,  $52^*$ ,  $53^*$ ,  $54^*$ ,  $56^*$ ,  $60^*$ ,  $62^*$ ,  $64^*$ ,  $70^*$ ;  $n = 20^*$ .

Orillas de arroyos, fuentes y turberas, indiferente al substrato; (50)600-1800(2300) m. IV-VI. Eurasia y N de América. N y C de la Península. **And. Esp.:** Av B Bi Bu C Cc Ge Hu L Le Lu Na O Or P Po S Sa SS Vi Za. **Port.:** BA Mi TM. **N.v.:** calta, hierba centella; *port.:* calta, malmequer-dos-brejos; *cat.:* calta, flor del mal d'ulls; *gall.:* herba centella.

Planta tóxica.

*Observaciones.*—Planta polimorfa, de la que se han descrito numerosas pequeñas especies o variedades. Cabe destacar la var. **minor** (Mill.) DC., Prodr. 1: 45 (1824) [*C. minor* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768), basión.], de tallo grueso, postrado-radicante, muy ramoso, hojas grandes y flores medianas, de hasta 3 cm de diámetro. Vive en parte del Pirineo, Extremadura y Portugal.