

13. *Hepatica* Mill.*

[Hepática f. – gr. *hepatiké* = relativo al hígado. Por el aspecto de las hojas y el uso médico antiguo]

Rizoma corto. Tallos unifloros, con 3 brácteas verticiladas, enteras y muy próximas a la flor, que pueden tomarse por un cáliz. Hojas de la base lobadas tan solo. Flores actinomorfas. Perianto con 1 envuelta de 6-9 piezas petaloideas, libres. Aquenios numerosos. Estilos no acrescentes ni plumosos en la madurez.

1. **H. nobilis** Schreb., Spic. Fl. Lips.: 39 (1771)

[nóbilis]

Anemone hepatica L., Sp. Pl.: 538 (1753) [nom. subst.]

H. triloba Chaix, Pl. Vap.: 32 (1785)

Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus lapidosis”


l.c.: Lám. 90

Herbácea, vivaz. Tallos floríferos c. 10 cm, endebles, no sobresaliendo apenas del conjunto foliar. Hojas basales cordado-trilobas, la mayor parte de las veces maculadas por el haz y con frecuencia rojizas por el envés, glabrescentes por fin como caso normal. Brácteas enteras. Piezas periánticas variables en magnitud, número y color, azuladas muy de ordinario, blancas del todo no raramente, rosas o purpúreas alguna vez. $2n = 14$.

Bosques o sitios más bien húmedos, incluso en roquedos altos, calcícola preferentemente. II-VI. Circumboreal, que no alcanza Baleares ni Marruecos. Mitad E de la Península Ibérica. **And. Esp.:** A Ab Al B Bi Bu CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Mu? Na O P S Sg So SS T Te V Vi Z. **N.v.:** hepática, trébol dorado, hierba de la Trinidad, hierba del hígado; *cat.:* herba fetgera, felera, viola de pastor, viola de llop, viola de galapat, viola borda; *eusk.:* gibel-bedarra.

Observaciones.—Se creyó que las anteras amarillentas y algún otro leve detalle podrían ser caracteres diagnósticos de la planta española [*Anemone hepatica* var. *hispanica* Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 947 (1880)], lo que no parece haberse confirmado.

* M. Laínz



Lám. 90.—*Hepatica nobilis*, entre Carril y Fredes, Castellón (MA 230826): a) hábito; b) flor; c) pedúnculo fructífero; d) aquenios.