


18. *Ceratocephala* Moench *

[*Ceratocéphala* f. – gr. *kéras, kératos* = cuerno; gr. *kephalé* = cabeza. Hace referencia a la forma de los frutos]

Hierbas anuales, pequeñas. Hojas todas basales, con los segmentos divididos dicotómicamente en lacinias. Flores actinomorfas, solitarias, terminales.

* F. Amich



Lám. 123.—*Ceratocephala falcata* var. *barrelieri*, Villafáfila, Zamora (SALA 7077): a) hábito; b) hojas; c) flor; d) pétalo; e) poliakuenio; f) achenios.

18. *Ceratocephala*

Perianto formado por 2 envolturas de 5 piezas; las externas (sépalos), verdosas; las internas (pétalos o nectarios), de un amarillo pálido, llevando éstas en su base una fosa nectarífera recubierta por una escama. Estambres 5-10. Carpelos numerosos, libres. Poliaquenio de hasta 5×2 cm, espiciforme. Aquenios con 2 protuberancias estériles en la base y terminados por un pico \pm falciforme, 2-3 veces mayor que la parte seminífera.

Bibliografía.—J. CHRTEK & A. CHRTKOVÁ in Preslia 48: 113-123 (1976).

1. *C. falcata* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 341 (1805)

[falcáta]

Ranunculus falcatus L., Sp. Pl.: 556 (1753) [basión.]

Ind. loc.: "Habitat inter segetes Europae australis"

lc.: Lám. 123

Hierba \pm vilosa, de un verde ceniciento, escaposa o subescaposa, con raíces tenues y fasciculadas. Tallo 2-12 cm, habitualmente simple, erecto o ascendente, lanuginoso. Hojas en roseta basal, con pecíolo de longitud muy apreciable, trifidas, enteras o 1-2 partidas, \pm obtusas en el ápice; toda la hoja con pelos blandos, crespos, \pm densos. Flores 0,8-1,6 cm de diámetro. Sépalos obtusos, lanuginosos en el dorso, aplicados sobre la corola. Pétalos c. 1,5 veces mayores que los sépalos, glabros. Estambres 5-10, más cortos que los pétalos, con anteras amarillo-claras. Poliaquenio de hasta 5×2 cm, sobrepasando habitualmente las hojas. Aquenios desde glabrescentes a lanuginosos, con pico aplanado, de longitud superior a la mitad del total. $2n = 40^*$.

Cultivos, baldíos, pastos rocosos y arenosos; basófila; zona basal. III-VII. E y S de Europa, C y W de Asia, N de África. Dispersa por gran parte de la Península, pero ausente de Portugal. *N.v.*: falsa centella, hierba del cuerno, ranillo, rosita del campo; *cat.*: ceratocéfalo.

1. Aquenios 7-10 mm; glabros, glabrescentes o poco vilosos en la madurez, con pico claramente falciforme, incluso cuando jóvenes; poliaquenio de longitud no mayor del doble que su anchura **a₁** var. **falcata**
 – Aquenios 4-7 mm, lanuginosos cuando maduros, con pico casi recto, solamente curvado en gancho apicalmente; poliaquenio de longitud hasta 3,5-4 veces su anchura **a₂** var. **barrelieri**

a₁ var. **falcata**

C y S de España. **Esp.**: Co Cu Gu M.

a₂ var. **barrelieri** Léon Dufour in Bull. Soc. Bot. France
7: 221(1860)

[Barreliéri]

Dispersa por casi toda España peninsular. **Esp.**: Ab Al Av B Bu CR Cu Gr Gu Hu L Le Lo M Na P Sa Sg So T Te To V Va Z Za.