

2. *Meconopsis* Vig.*

[*Meconópsis* f. – gr. *mḗkōn* = adormidera, amapola; gr. *ópsis* = aspecto]

Hierbas anuales o vivaces, con látex amarillo. Flores actinomorfas, solitarias. Pétalos 4, de prefloración corrugada. Estambres numerosos. Estilo corto pero neto; estigmas 4-6, que alternan con las placentas y terminan en un disco convexo, hemisférico. Cápsula claviforme, unilocular, abriéndose desde el ápice por 4-6 valvas cortas, hasta c. 1/5 de su longitud. Semillas sin arilo.

1. *M. cambrica* (L.) Vig., Hist. Pavots Argém.: 48 (1814) [cámbrica]


P. cambricum L., Sp. Pl.: 508 (1753) [basión.]

Ind. loc.: "Habitat in Cambriae septentrionalis nemorosis"

lc.: lám. 139

Vivaz, con pelos esparcidos. Raíz de hasta 15 cm, poco ramificada. Tallo 30-65 cm, ramoso, erecto. Hojas basales largamente pecioladas, imparipinnatisectas, hasta con 4 pares de segmentos, más el terminal; éstos irregularmente inciso-dentados, ± oval-lanceolados, verde-oscuros por el haz y glaucos por el envés; hojas caulinares más cortamente pecioladas. Flores sobre pedúnculos axilares muy prolongados, nutantes antes de la antesis, luego erectos. Sépalos pelosos. Pétalos de hasta 4 cm, glabros, obovado-redondeados, de color amarillo limón, anaranjados al desecarse. Estambres amarillos, con filamento muy delgado. Estilo corto. Cápsula 2-4 × c. 1 cm, glabra. Semillas c. 1 mm, numerosas, negruzcas, ovoideo-reniformes, reticulado-alveoladas. $2n = 14^*$, 22^* , 28^* , 56^* .

Claros de bosque y suelos removidos; nitrófila, esciófila e indiferente al substrato; 0-2100 m. IV-IX. N de España, Francia e Islas Británicas. Sistemas cántabro-pirenaico e ibérico. **Esp.**: Bi Bu Hu L Le Lo Lu Na O SS Vi. **N.v.**: amapola amarilla; *cat.*: meconopsis.



Lám. 139.—*Meconopsis cambrica*, Vall de Arán, Lérida (BC 78627): a) hábito; b) botón floral; c) flor desprovista de perianto; d) cápsula abierta; e) semilla.