


3. Argemone L.**

[Argemón f. – gr. *argemónē* = argemone, por su antiguo uso para curar afecciones de los ojos
(gr. *árgemon* = nube en el ojo)]

Herbáceas, anuales o bienales, raramente vivaces, erectas, ramosas, $\pm$ espinosas, con látex amarillo. Hojas basales en roseta y caulinares alternas, subamplexicaules, sinuado-lobadas, con margen irregularmente dentado-espinoso.

* L. Villar ** I. Nogueira



Lám. 140.—*Argemone mexicana*, Barcelona, cultivada en Jardín Botánico: a) hábito; b) detalle de una flor; c) cápsula abierta; d) semilla.

4. *Roemeria*

Flores actinomorfas, terminales, solitarias o dispuestas en cimas. Sépalos 2-3, libres, corniculados en el ápice, caducos. Pétalos 4-6, dispuestos en 2-3 series, blancos, amarillos o anaranjados. Estambres numerosos; filamentos filiformes y anteras lineares. Carpelos 3-6, con igual número de estigmas y alternando con las placentas. Estilo nulo o casi. Cápsula elipsoidal, aculeada o inerme, dehiscente por 3-6 valvas apicales. Semillas globosas, reticuladas.

Bibliografía.—F. FEDDE in A. ENGLER, Pflanzenr. 40: 271-287 (1909).

1. *A. mexicana* L., Sp. Pl.: 508 (1753)

[mexicana]

Ind. loc.: "Habitat in Mexico, Jamaica, Caribaeis, nunc in Europa australi"

Ik.: Lám. 140

Anual, de hasta 1 m, glauca. Ramas $\pm$ fastigiadas o patentes. Hojas 8-25 $\times$ 2,5-10 cm, sinuado-pinnatífidas, frecuentemente variegadas y con los nervios blanquecinos. Flores sustentadas por 2-3 brácteas foliáceas. Sépalos terminados en punta espinosa y salpicados de espinas en su cara externa. Pétalos 2-3 cm, obovados, amarillos. Ovario cubierto de espinas; estigma 5-lobulado, rojo. Cápsula c. 3 $\times$ 1,5 cm, espinosa, dehiscente por 5 valvas. Semillas 2-2,5 mm de diámetro, globosas, negruzcas. $2n = 14^*, 28^*, 112^*$.

Ruderal. VI-VIII. Originaria de las zonas tropicales de Centro y Sudamérica, introducida en varios países de Europa, Asia, África y Australia. **Esp.**: posiblemente, solo cultivada. **Port.**: [E].

Observaciones.—El carácter naturalizado de esta planta es muy dudoso, pues de ella no se conocen —a un lado lo jardineril— más que dos recolecciones casuales de la Estremadura portuguesa.