

6. *Chelidonium* L.*

[*Chelidonium* n. – gr. *chelidónion* = golondrina pequeña // celidonia. Según Teofrasto y Dioscórides, porque nacen cuando llegan las golondrinas]

Herbáceas, vivaces, con látex amarillo anaranjado. Flores actinomorfas, pediceladas, dispuestas en umbelas pedunculadas, terminales o axilares. Pétalos 4, de prefloración corrugada. Estambres numerosos, con anteras elipsoidales. Ovario con estilo muy corto y 2 estigmas divergentes. Cápsula silicuiforme, unilocular, dehiscente de la base al ápice por 2 valvas. Semillas globosas, con arilo crestado.

Bibliografía.—F. FEDDE in A. ENGLER, *Pflanzenr.* 40: 212-215 (1909).

1. *Ch. majus* L., *Sp. Pl.*: 505 (1753)

[május]

Ind. loc.: “Habitat in Europae ruderatis”

lc.: Lám. 143

Erecta, de hasta 1 m, glauca. Tallo ramificado y folioso desde la base, ± pubescente, principalmente en los entrenudos. Hojas 12-20 × 7-10 cm, pinnatisec-

* J. Paiva



Lám. 143.—*Chelidonium majus*, Campins, Montseny, Barcelona (BC 655700): a) hábito; b) botón floral; c) flor; d) estambre; e) semilla.

7. *Escholzia*

tas, con 5-7 pares de segmentos de ovados a oblongos, desigualmente crenado-lobados; las basales pecioladas y las caulinares a veces subsésiles. Umbelas de 2-6(10) flores, con los pedicelos de 3-8 cm, menores que el pedúnculo (5-10 cm). Sépalos (5)7-9(10) × 3-5 mm, obovados, amarillo-verdosos, generalmente con tricomas apicales. Pétalos 8-15(16) × 6-9(10) mm, obovados, unguiculados, de un amarillo vivo. Filamentos estaminales filiformes; anteras amarillas. Cápsula 30-50(60) × 2-3 mm, torulosa, glabra. Semillas 1-2 mm, negras, con arilo blanco. $2n = 10^*$, 12, 16*; $n = 6$.

Ruderal; muros, fisuras o sitios umbrosos y frescos; 0-1600 m. III-IX. Europa, Asia, África y América septentrional. Prácticamente en toda la Península y Baleares, excepto SE árido. **And.** **Esp.:** A (Ab) Av B Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or (P) PM[Mill Mn] Po S Sa Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. **Port.:** todas las provincias. **N.v.:** celidonia mayor, hierba de las golondrinas, hierba verruguera, golondrinera; *port.:* erva-das-verrugas, celidónia, erva-andorinha; *cat.:* herba d'orenetes, celidònia, herba de les berrugues; *eusk.:* ainhara-belarra, zaran-belarra; *gall.:* celedoña, herba d'anduriña, ceruda, celidonia.

Planta cáustica e irritante. Su látex se ha utilizado en medicina popular para curar verrugas, etc.