

9. *Corydalis* DC. [nom. cons.]*

[*Corýdalis* f. – gr. *korydálion* n., en Pseudo-Dioscórides, sinónimo de *kapnós* = fumaria]

Tuberosas, vivaces. Hojas ternadas. Inflorescencia en racimo; brácteas foliáceas. Flores zigomorfas. Sépalos pequeños, petaloideos, caducos. Pétalos 4; los externos, distintos de los internos; el superior, mayor, alado hacia el ápice, con 1 espolón basal; los internos (laterales), más estrechos y unidos en el ápice, donde forman 1 ala media y 2 pliegues laterales. Estambres 2, el superior con 1 nectario basal, cada uno de ellos con 3 anteras, la central con 2 tecas y las laterales con 1. Estigma plano, con numerosas papilas marginales. Cápsula oblonga, polisperma, de estilo persistente, dehiscente por 2 valvas. Semillas negras, con arilo.

- 1. Tallo florífero sin escama foliosa **1. C. cava**
- Tallo florífero con una escama foliosa cerca de la base **2**
- 2. Brácteas enteras **3. C. intermedia**
- Brácteas, al menos las inferiores, divididas **2. C. solida**

1. *C. cava* (L.) Schweigg. & Körte, Spec. Fl. Erlang. 2: 44 (1811) [cáva] subsp. **cava**

Fumaria bulbosa var. *cava* L., Sp. Pl.: 699 (1753) [basión.]

C. bulbosa auct. p.p., non DC.

Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus & umbrosis” [loc. de *F. bulbosa* L. s.l.]


Ik.: Lám. 146

Erecta, 20-30 cm. Tubérculo que se ahueca con la edad. Tallos floríferos sin escama foliosa basal. Hojas 2-ternadas, alternas, con los segmentos obtusos. Brácteas enteras, ovadas. Flores violáceas, blancas o purpúreas; nectario obtuso, soldado al espolón en la mayor parte de su longitud. Ovario generalmente atenuado en estilo. Fruto péndulo en la madurez. $2n = 16^*$, 32^* .

Bosques caducifolios; 500-800 m. IV-VI. Europa. Dispersa por la mitad N peninsular. **Esp.:** (Gu) Le Lu Na O (Or) P S (SS) Vi. **Port.:** TM. **N.v.:** aristoloquia hueca, violeta pequeña.

Los tubérculos son ricos en alcaloides, uno de los cuales, la bulbocapnina, provoca catalepsia.

* M. Lidén



Lám. 146.—*Corydalis eava*, a-e) León (MA 204714), f-g) Sueros, Asturias (BC 02254): a) hábito; b) sépalos; c) flor; d) fruto inmaduro; e) detalles del estigma; f) fruto; g) semilla.

2. **C. *solida*** Clairv., Man. Herbor. Suisse: 371 (1811) [sólida]
 subsp. **solida**

Fumaria bulbosa var. *solida* L., Sp. Pl.: 699 (1753)

C. bulbosa sensu DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 637 (1805)

Ind. loc.: "Habitat in Europae nemoribus & umbrosis" [loc. de *F. bulbosa* L. s.l.]

lc.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(1), Taf. 124 Fig. 2 (1958)

Generalmente erecta, 15-20(25) cm. Tubérculo pequeño, macizo, que se renueva cada año. Hojas generalmente 2-ternadas. Tallo con 1 escama foliosa cerca de la base, de la que a menudo nace un nuevo vástago. Brácteas, al menos las inferiores, digitadas. Flores rosadas, con nectario atenuado hacia el ápice, muy cortamente soldado al espolón. $2n = 16^*$, 24^* , 32^* .

Bosques, parques, majadas, pastos y depresiones con suelo fértil; 700-2000 m. III-V. Argelia y regiones templadas de Eurasia. NE peninsular. **Esp.**: B? Ge Hu L Na. **N.v.**, *cat.*: tisuretes.

3. **C. *intermedia*** (L.) Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris: 272 (1812) [intermedia]

Fumaria bulbosa var. *intermedia* L., Sp. Pl.: 699 (1753) [basión.]

Ind. loc.: "Habitat in Europae nemoribus & umbrosis" [loc. de *F. bulbosa* L. s.l.]

lc.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(1): 61 Fig. 41f-k (1958) [sub *C. fabacea*]

Erecta, c. 10 cm. Tubérculo macizo. Tallos con 1 escama foliosa en la base. Hojas 2-ternadas. Racimos densos, de 1-6 flores. Pedicelos mucho más cortos que las brácteas, que son enteras. Corola purpúrea, con espolón débilmente curvado. Ovario atenuado en 1 estilo persistente. $2n = 16^*$, 20^* , 40^* .

Sotobosque de pinares de *P. sylvestris*; 1500-1600 m. IV-V(VIII-IX). N y C de Europa, Sierra de Urbión. **Esp.**: So.