


14. Rupicapnos Pomel*

[Rupicápnos f. – lat. *rupes* = roca; gr. *kapnós* m., lat. *capnos* f. = fumaria. Nace en los roquedos]

Casmófitos carnosos, glaucos. Hojas 2-pinnatisectas o 2-ternatisectas, con segmentos de lineares a lanceolados. Racimos corimbosos, con brácteas pe-

* M. Lidén



Lám. 158.—*Rupicapnos africana* subsp. *decipiens*, Desfiladero de los Gaitanes, Málaga (MA 239333): a) hábito; b) tipos de hojas; c) pedicelo florífero; d) pétalo externo inferior en vista lateral; e) pétalo externo superior en vista dorsal; f) gineceo; g) estigma; h) fruto.

14. **Rupicapnos**

queñas, escariosas. Pedicelos mayores que la bráctea y que se alargan, para facilitar la geocarpia, en la fructificación. Flores zigomorfas, blancas o de un rosa pálido. Sépalos petaloideos. Pétalos 4; los externos, distintos de los internos; el superior, mayor, con un espolón basal, alado hacia el ápice; los internos (laterales), más estrechos, unidos en el ápice, donde forman 1 ala media y 2 pliegues laterales. Estambres 2; el superior, con 1 nectario basal, cada uno de ellos con 3 anteras; la central con 2 tecas y las laterales con 1. Fruto monospermo, globoso, tuberculado-rugoso, sin poros germinales en el ápice.

1. R. africana (Lam.) Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. [africana]
Algérie 11: 240 (1874)

Fumaria africana Lam., Encycl. 2: 569 (1786)

subsp. **decipiens** (Pugsley) Maire in Jahand. & Maire, [decipiens]
Cat. Pl. Maroc: 261 (1932)

R. decipiens Pugsley in J. Linn. Soc., Bot. 44: 345 (1919) [basión.]

Fumaria africana sensu Lange in Willk. & Lange

Ind. loc.: "In fissuris rupium, ad 400 m. adscendens, regioniss Sierra de Alora et Pizarra in provincia Malacitana atque prope Grazaleda in provincia Gaditana Hispaniae invenitur"

Ik.: Lám. 158

Perenne, a veces anual, 5-10 cm, glauca. Cepa generalmente gruesa. Tallo corto, frágil, densamente folioso en la base. Hojas 2-pinnatisectas, ± carnosas. Flores 11-16 mm (o menores en las formas de sombra), blancas. Pétalos internos con el ápice púrpura oscuro. Fruto 3-3,5 × 2,75-3 mm, subgloboso, rugoso, obtuso, con un pico corto. $2n = 32$.

Paredones verticales, generalmente en rocas calizas, raramente en areniscas; en poblaciones pequeñas, como norma; 300-700 m. III-VI. N de Marruecos y S de la Península Ibérica. Montañas de la mitad W de Málaga, Grazaleda, Sierra de Algodonales y Estepa. **Esp.**: Ca Ma Se.

Observaciones.—Aunque cada población es homogénea, entre unas y otras hay gran diferencia, en especial por lo que se refiere a la forma de la hoja.