


1. *Commicarpus* Standl.*

[*Commicárpus* m. – gr. *kóm̐mi* m.; lat. *cummi* (*commi* y otras variantes) n. y f. = goma; gr. *karpós* m. = fruto. Por los frutos pegajosos, según el autor del género]

Hierbas perennes o sufrútices, a veces trepadores. Hojas opuestas, sésiles o pecioladas, enteras o sinuadas. Flores hermafroditas, generalmente en inflorescencias cimosas axilares, umbeliformes o paniculiformes; brácteas diminutas. Perianto petaloideo, 5-lobulado, con lóbulos plegados, $\pm$ contraído por encima del ovario. Estambres 2-5, soldados en la base. Ovario estipitado; estilo filiforme; estigma peltado. Antocarpio obovoide-turbinado o claviforme, con 10 costillas finas, glanduloso en el ápice.

Observaciones.—El género *Commicarpus* Standl. se incluye a veces, como subgénero o sección, en *Boerhavia* L. [cf. F.R. FOSBERG in Smithsonian Contr. Bot. 39: 2 (1978)].

** P. Galán Cela



Lám. 12.—*Commicarpus africanus*, a) Callosa de Segura, Alicante (MA 315948); b-e) Cuevas de Almanzora, Almería (MA 315946): a) hábito; b) flor; c) ídem en corte longitudinal; d) fruto y antocarpio; e) fruto con el antocarpio abierto longitudinalmente.

2. **Mirabilis****1. C. africanus** (Lour.) Dandy in F.W. Andrews, [africánus]
Fl. Pl. Anglo-Egypt. Sudan 1: 152 (1950)*Boerhavia africana* Lour., Fl. Conchinch.: 16 (1790) [basión.]*B. plumbaginea* Cav., Icon. 2: 7, tab. 112 (1793)*Ind. loc.*: "Habitat [sic] Mozambicci in Africâ Orientali"*Ic.*: Lám. 12

Planta sufruticosa. Tallos difusos, arqueados o procumbentes, algo lignificados en la base, con largos entrenudos; corteza verde o blanquecina con el tiempo. Hojas 30-75 × 17-40 mm, de ovado-orbiculares a deltadas, a menudo subcordadas, pecioladas, pubescentes por el envés. Inflorescencias largamente pedunculadas, generalmente contraídas en umbela o formando verticilos. Perianto 10-13 mm, petaloideo, infundibuliforme, blanquecino o blanco-rosado, pubescente, con la parte basal más recia, diferenciada del resto; lóbulos ± orbiculares, bífidios. Estambres generalmente 3, por lo común exertos. Antocarpio de hasta 11 mm, claviforme, con c. 10 tubérculos glandulosos, pediculados, en la parte superior.

Pie de roquedos, muros o en grietas de rocas calizas, generalmente en las cercanías de lugares habitados o recientemente abandonados por el hombre; c. 200-400 m. V-X. C y E de África, extendiéndose hasta Oriente Medio, región mediterránea y áreas adyacentes. SE de la Península Ibérica. **Esp.**: A Al Mu.