

2. *Sesuvium* L.*

[*Sesúvium* n. – lat. *sesuvium* -i = sinónimo de *sedum* (lat. *sedum*, -i n. = nombre de diversas crasuláceas de los géneros *Sedum* y *Sempervivum*)]

Anuales o perennes, postradas o ascendentes. Hojas opuestas o alternas, generalmente pecioladas y heteromorfas, sin estípulas. Flores solitarias axilares. Perianto de 5 tépalos, soldados en tubo corto, obcónico, con lóbulos triangulares, patentes, de márgenes membranáceos, corniculados subapicalmente en el dorso. Estambres de 5 a numerosos, insertos en la garganta del perianto, libres o soldados en la base formando un anillo. Ovario súpero, con 2-5 lóculos; rudimentos seminales numerosos en cada lóculo, de placentación axilar; estilos linear-claviformes, estigmatíferos por su cara interna. Pixidio con 2-5 lóculos, membranáceo. Semillas numerosas, redondeado-subreniformes, de hilo saliente.

1. *S. portulacastrum* (L.) L. Syst. Nat.

[*Portulacástrum*]

ed. 10: 1058 (1759)


Portulaca portulacastrum L., Sp. Pl.: 446 (1753) [basión.]

Ind. loc.: “Habitat in Curassao”

Ic.: Lám. 18

Hierba perenne, ± suculenta, glabra. Tallos de hasta 80 cm, ramosos, a veces radicantes. Hojas 10-60 × 1-14 mm, no papilosas, de obovado-oblongas a linear-espatuladas, obtusas o subagudas, atenuadas en la base en pecíolo corto, semiamplexicaule y adnato al de la hoja opuesta. Flores solitarias; pedúnculos

* M.L. Gonçalves



Lám. 18.—*Sesuvium portulacastrum*, cultivado en el Real Jardín Botánico, Madrid (MA 216560): a) rama en flor y fruto; b) detalle de una flor; c) flor en sección longitudinal; d) fruto; e) fruto maduro y abierto; f) sección transversal del fruto; g) semilla.

3. Galenia

3-23 mm. Tépalos $4-8 \times 3-5$ mm, petaloideos, ovado-lanceolados, agudos, con el apículo dorsal de c. 1,5 mm, carnosos, rosados o purpúreos interiormente, verdes exteriormente. Estambres numerosos, libres. Ovario con (2)3-5 lóculos; estilos (2)3-5. Pixidio c. $6,5 \times 3$ mm, oblongo-elipsoidal u obovoideo, el cual se abre aproximadamente por su zona media. Semillas c. $1,2 \times 0,8$ mm, negras y lisas. $n = 8$.

Arenales y roquedos costeros. VI-VIII. Pantropical. Subespontánea en Trafaria (Almada); tal vez hoy allí extinta. **Port.:** [E].