

8. *Disphyma* N.E. Br.*

[*Disphýma* n. – gr. *dís* = dos veces; gr. *phýma* = excrecencia, tumor. Por los tubérculos placentarios bilobados]

Sufrútices crasos, glabros, sin papilas cristalinas. Tallos postrados, radican-tes; ramillas cortas multifoliadas. Hojas opuestas, sésiles y semiamplexicaules, cortamente adnatas en la base, hialino-punteadas, sin estípulas. Flores 1-3, terminales, pedunculadas, sin brácteas. Tépalos 5, frecuentemente desiguales; los internos de márgenes membranáceos. Estaminodios petaloideos libres, en 2 verticilos, el interno de pocas piezas. Estambres numerosos, erectos. Ovario ínfero, de 5 carpelos y placentación parietal, con tubérculos placentarios bilobados y opérculos locales; estigmas 5, subulados, densamente plumosos. Cápsula loculicida, con 5 lóculos, valvas con crestas de expansión divergentes y sin alas marginales. Semillas subovoideas y casi lisas.

1. *D. crassifolium* (L.) L. Bolus

[*crassifólium*]


in Fl. Pl. South Africa 7, tab. 276 (1927)

Mesembryanthemum crassifolium L., Sp. Pl.: 484 (1753) [basión.]

Ind. loc.: “Habitat in Africa”

Ic.: Lám. 24

* M.L. Gonçalves



Lám. 24.—*Disphyma crassifolium*, Estremadura, Portugal (MA 260394): a) hábito; b) flor; c) flor en sección longitudinal; d) estambres; e) fruto en sección transversal; f) semillas con funículo.

Tallos de hasta 30 cm o más; los más jóvenes, herbáceos y flácidos. Hojas 2-2,5 × 0,5-0,9 cm, oblongas, obtusas, verde-oscuro, brillantes y lisas; de sección semicircular hacia la base y subtriangular –hojas ± aquilladas- en el resto; las de las ramas mayores, distantes; las de los braquiblastos, agrupadas; 1 de las 2 de cada nudo recurvada, la otra incurvada. Flores 2,5-4 cm de diámetro. Estaminodios petaloideos, 1-1,5 cm, intensamente purpúreos.

Roquedos y arenales del litoral. IV-VI. Originaria de África austral; subespontánea en puntos dispersos del litoral mediterráneo. Escapada de cultivos en las Baleares, la Estremadura portuguesa y S de Galicia. **Esp.:** [PM][MII Mn] [(Po)]. **Port.:** [E].

Frecuentemente cultivada como planta de revestimiento.