

10. *Drosanthemum*10. *Drosanthemum* Schwantes*[*Drosánthemum* n. – gr. *drósos* f. = rocío; gr. *ánthemón* n. = flor]

Sufrútices o subarbustos, cristalino-papilosos en todas las partes verdes. Tallos de erectos o decumbentes a postrados o trepadores y radicantes. Hojas opuestas, sésiles, cortamente adnatas en la base, homomorfas, de sección circular o semicircular, sin estípulas. Flores solitarias o en cimas terminales, generalmente pedunculadas, o en ramitas laterales cortas. Tépalos 5(6), subiguales. Estaminodios petaloideos, numerosos, en 1-3 verticilos. Estambres numerosos, conniventes en cono. Ovario ínfero, de 5(6) carpelos; placentación parietal; tubérculos placentarios pequeños o sin ellos; opérculos locales pequeños; estigmas subulados y plumosos. Cápsula loculicida, con 4-6 lóculos; valvas con crestas contiguas, paralelas o divergentes, y alas marginales anchas. Semillas reniformes, acostilladas y con tubérculos finos.

1. Tubo del perianto semigloboso; estaminodios petaloideos de color rosa ± vivo; estigmas de mayor longitud que los estambres **1. D. floribundum**
 – Tubo del perianto obcónico; estaminodios petaloideos de rosa pálido a casi blancos; estigmas que no sobrepasan a los estambres **2. D. candens**

1. D. floribundum (Haw.) Schwantes

[floribúndum]

in Z. Sukkulentenk. 3: 29 (1927)

Mesembryanthemum floribundum Haw., Misc. Nat.: 100 (1803) [basió.]*Ind. loc.*: "Habitat Cap. Bon. Sp."*lc.*: Lám. 26

Sufrútice de hasta 12 cm, al fin leñoso. Tallos delgados, postrado-difusos, no o apenas radicantes, muy ramosos, formando densos tapices, a veces colgantes, hispídos, con pelos blancos retrorsos. Hojas 5-16 × 2-3 mm, cilíndricas, obtusas, verdes, patentes o algo reflejas, con fascículos de hojas axilares, densamente cubiertas de papilas hialinas redondeadas. Flores 2-2,5 cm de diámetro; pedúnculos 1-3 cm. Perianto con tubo subgloboso y lóbulos lineares, obtusiúsculos. Estaminodios petaloideos, de longitud 2-3 veces mayor que la de los tépalos, en un solo verticilo, de color rosa intenso. Estambres más cortos que los estigmas; filamentos blancos, pilosos en la base.

Roquedos cársticos. III-VI. Originaria de Sudáfrica; cultivada o subespontánea en el Mediterráneo. Escapada de cultivos en las Baleares, Alto Alentejo y la Estremadura portuguesa. **Esp.**: [PM][MII]. **Port.**: [AAI] [E].

Cultivada como ornamental, para revestimiento de muros, en rocallas, etc.

2. D. candens (Haw.) Schwantes

[cándens]

in Z. Sukkulentenk. 3: 29 (1927)

Mesembryanthemum candens Haw., Revis. Pl. Succ.: 186 (1821) [basió.]*Ind. loc.*: [África austral, indicación que no se hace de forma expresa]*lc.*: Salm-Dyck, Aloes Mesembr., sect. 51, fig. 4 (1842)

* M.L. Gonçalves



Lám. 26.—*Drosanthemum floribundum*, Alto Alentejo (MA 260396): a) hábito; b) detalle del tallo y hojas; c) ramilla florífera; d) estambres; e) flor en sección longitudinal; f) ovario en sección transversal; g) fruto; h) semilla con su funículo.

10. Drosanthemum

Semejante a **1**, pero menos leñosa y más compacta. Hojas de hasta 5 mm de grosor, más densamente dispuestas, de incurvado-erectas a recurvado-patentes. Tubo del perianto obcónico. Estaminodios petaloideos, de longitud solo ligeramente mayor que la de los sépalos, de rosa pálido a blancos; estambres que igualan a los estigmas. $2n = 36^*$.

Terrenos rocosos del litoral. V-VII. Originaria de Sudáfrica; subespontánea en el SW de Inglaterra. Escapada de cultivo en la Estremadura portuguesa. **Port.:** [E].