

1. *Telephium* L.*

[*Telephium* n. – gr. *tēléphion*; lat. *telephion*, -i = nombre de una planta, en Dioscórides y Plinio, con hojas crasas y carnosas y flores amarillas o blancas; unos la han creído *Sedum telephium* L., otros *Andrachne telephoides* L. y otros, en fin, *Cerintho minor* L. Según Plinio, el nombre alude a que Télefo, rey de Misia, herido por Aquiles, curó con un emplastro de la planta]

Hierbas perennes, raramente anuales. Hojas alternas, frecuentemente secundas, enteras; estípulas escariosas, auriculadas. Flores hipóginas, en cimas terminales densas, capitado-corimbiformes. Sépalos 5, libres. Pétalos 5, enteros, blancos, insertos, al igual que los estambres, en un disco perígino amarillento. Estambres 5, opuestos a los pétalos. Ovario trígono ovoide, atenuado superiormente, con 3(4) septos incompletos en la base; estilos 3, cortos. Fruto en cápsula, papiráceo, dehiscente por 3(4) valvas. Semillas numerosas, subglobosas u ovado-reniformes.

1. *T. imperati* L., Sp. Pl.: 271 (1753)

[Imperáti]


subsp. **imperati**

Ind. loc.: “Habitat in Gallo-provincia”

Ic.: Lám. 29

Hierba perenne, glabra, glauca, con cepa leñosa y ramificada. Tallos de hasta 50 cm, procumbentes, rara vez ascendentes y ramificados. Hojas (3)5-25(36) × 2-11(18) mm –las inferiores y las de los tallos estériles más pequeñas–, carnositas, subelípticas, obovales u oboval-oblongas, atenuadas en la base, obtusas, a veces levemente mucronadas en el ápice; estípulas c. 2 mm, habitualmente caducas. Sépalos (3,5)4-6 mm, acrescentes, lanceolados u oblongos, aquillados, verdes, de margen blanco escarioso, variable en anchura, y de ápice revuelto hacia el interior. Pétalos iguales o, más comúnmente, algo menores que los sépalos. Cápsula mayor que el cáliz, acuminada, de color castaño. Semillas c. 1,5 mm, ovado-reniformes, algo comprimidas lateralmente, negras y brillantes en la madurez, finamente granulosas. $2n = 18$.

* P. Galán Cela



ESR 87

Lám. 29.—*Telephium imperati* subsp. *imperati*, a-b, j-k) El Balletero, Albacete (MA 301096); c-i) Castromonte, Valladolid (MA 220165): a) hábito; b) base foliar con estípulas; c-d) flores; e) corte longitudinal de la flor; f) pétalo; g) estambres; h) pistilo; i) corte transversal del pistilo; j) cápsula; k) semilla.

2. Corrigiola

Lugares pedregosos o roquedos calizos \pm ruderalizados, muy raramente en pizarras o terrenos silíceos; 50-2200 m. III-VII. W de la región mediterránea. En la Península Ibérica, principalmente en la mitad E, faltando en Andalucía occidental, Portugal, Galicia, Cornisa Cantábrica y las Baleares. (**And.**). **Esp.:** (A) Ab Al (B) Bu CR Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na S Sg So (T) Te To V Va Vi Z Za. **N.v.:** estrella rastrera, estrellada rastrera; *cat.*: telefí rastrer.