

2. *Corrigiola* L.*

[*Corrigiola* f. – lat. tardío *corrigiola*, -ae = nombre de la correhuela o centinodia (del lat. *corrigia*, -ae f. = correa // cordón de los zapatos). Al decir de muchos autores, porque los tallos de la planta, desparramados por el suelo, semejan pequeñas correas]

Hierbas anuales, bienales o perennes, glabras. Tallos decumbentes o ascendentes, difusamente ramificados. Hojas alternas, ocasionalmente subopuestas, insertas helicoidalmente pero en apariencia dísticas, de sésiles a subsésiles, enteras; estípulas escariosas, ± auriculadas. Flores períginas, en inflorescencias bracteadas, terminales y laterales, generalmente constituidas éstas por cimas agrupadas en glomérulos en los extremos de las ramas, aunque algunas veces por cimas pseudo-axilares y laterales distribuidas laxamente. Sépalos 5, glabros, verdes, de margen escarioso blanquecino. Pétalos 5, más cortos que los sépalos, oblongos, membranáceos, blanquecinos. Estambres 5. Ovario unilocular, con un solo rudimento seminal, unido a la base del ovario por un largo funículo. Estigmas 3, subsésiles. Fruto en aquenio, crustáceo y ± trígono, envuelto por el cáliz persistente. Semilla de testa membránacea y radícula súpera.

Bibliografía.—M.N. CHAUDHRI in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 34-52 (1968).

1. Hojas caulinares estrechamente oblanceoladas o, a veces, estrechamente oblongo-elípticas, de consistencia herbácea; aquenios 1-1,25 × 0,8-1 mm; ramas de la inflorescencia en general foliosas **1. *C. litoralis***
- Hojas caulinares oblongo-lanceoladas, espatuladas u obovadas, engrosado-carnosas; aquenios 1,3-1,5 × 1,25-1,4 mm; ramas de la inflorescencia afilas ... **2. *C. telephifolia***

1. *C. litoralis* L., Sp. Pl.: 271 (1753)


[litorális]

Ind. loc.: “Habitat in Galliae, Germaniae litoribus arenosis”

lc.: Lám. 30

Hierba anual, bienal o perenne. Tallos de hasta 50 cm, decumbentes, delgados, muy ramificados desde la base. Hojas sésiles o casi, estrechamente oblanceoladas o, a veces, estrechamente oblongo-elípticas, de agudas a subobtusas, atenuadas en la base, de margen entero o ligeramente undulado, herbáceo; estípulas c. 2,5 × 1,25 mm, asimétricamente ovado-auriculadas, de margen undulado, escariosas. Glomérulos terminales, subterminales y pseudo-axilares, sésiles o muy cortamente pedunculados, algo corimbosos, con las ramas en general foliosas; brácteas c. 1 mm, estrechamente ovadas, escariosas. Flores 1-2 mm, de ovoideas a subglobosas; pedicelos 0,5-2 mm. Sépalos 1-1,25 × 0,75-0,8 mm,

* M.N. Chaudhri



Lám. 30.—*Corrigiola litoralis* subsp. *litoralis*, El Tiemblo, Ávila (MA 372122): a) hábito; b) hojas de la parte basal, media y superior del tallo; c) glomérulo de flores; d-e) flores; f) corte longitudinal de una flor; g) aquenios.

2. *Corrigiola*

de oval-oblongos a ovado-oblongos, obtusos, de margen conspicuo. Ovario ovoideo; estigmas divergentes. Aquenio 1-1,25 × 0,8-1 mm, ovoideo-globoso, trigono, rugoso o granuloso. Semilla c. 0,75 mm, subglobosa.

Palestina, W, C y S de Europa, NW, C y S de África. **N.v.:** pasacamins; **port.:** correjola; **cat.:** passacamins.

1. Planta generalmente anual, con la base del tallo delgada; brácteas y estípulas sin margen rojizo, blanquecinas; flores 1-1,5 mm **a.** subsp. **litoralis**
- Planta perenne, con cepa robusta y leñosa; brácteas y estípulas de margen purpúreo o pardusco; flores (1,3)1,5-2 mm **b.** subsp. **perez-larae**

a. subsp. **litoralis**

Anual o bienal, con la base del tallo delgada. Hojas en general estrechamente oblanceoladas, las basales de hasta 25(40) × 2(2,5) mm, las caulinares de (4)6-13(20) × 0,5-2(3) mm. Brácteas y estípulas uniformemente escariosas, blanquecinas. Flores 1-1,5 mm. Sépalos 0,5-1 × 0,5-0,75 mm, ovado-oblongos, de margen escarioso blanquecino. Aquenio pardo. $2n = 16^*$, 18, 32; $n = 8^*$, 9.

Playas y suelos arenosos; 0-1400 m. (I)III-IX. Palestina, W, C y S de Europa, C y S de África. Dispersa por la mitad N de la Península Ibérica. **Esp.:** Av B Ba C Cc Ge Gu Le (Lo) Lu M O Or Po Sa Sg So (SS) (T)? To V (Va) Za. **Port.:** (AA1) BA BA1 BB BL DL E Mi R TM.

b. subsp. **perez-larae** Chaudhn, Muñoz Garmendia [Pérez-Lárae] & Pedrol in *Anales Jard. Bot. Madrid* 45: 586 (1989)

C. telephiifolia subvar. *foliosa* Pérez Lara in *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 20: 74 (1891) [nom. subst.]

C. litoralis subsp. *foliosa* (Pérez Lara) Chaudhri in *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht* 285: 38 (1968), nom. illeg.

Ind. loc.: "Hab. in arenosis rupestribusque humidiusculis regionis inferioris: prope Algar; in Dehesa de Garcisobaco et Llanos de Caulina ditionis Jerez et in aliis locis"

Jc.: Valdés, Talavera & Galiano, *Fl. Andalucía Occid.* 1: 207 (1987) [sub *C. litoralis* subsp. *foliosa*]

Perenne, con cepa gruesa y leñosa. Hojas basales de hasta 45 mm, las caulinares de hasta 11(19) × 3,5(5) mm, de estrechamente oblongo-elípticas a oblanceoladas; estípulas algo mayores que en la subsp. *litoralis*, de margen purpúreo o pardusco. Flores (1,3)1,5-2 mm, en glomérulos terminales y subterminales. Brácteas de margen purpúreo o pardusco. Sépalos 1-1,25 × 0,75-0,8 mm, de anchamente oval-oblongos a ovado-oblongos, de conspicuo margen membranáceo, blanquecino, aproximadamente igual o ligeramente más estrecho que la parte central. Pétalos c. 1 × 0,75 mm, anchamente oval-oblongos. Anteras c. 0,25 × 0,2 mm, purpúreas. Aquenio muy rugoso, marrón oscuro. $2n = 18$; $n = 9$.

Suelos arenosos húmedos; 0-400 m. (II)III-VI(IX). Península Ibérica y N de Marruecos. Cuadrante SW de la Península y Valencia. **Esp.:** Ba Ca Cc Co H Ma Se V. **Port.:** AA1 Ag BA1 E R.

2. C. telephiifolia Pourr. in *Hist. & Mém.* [telephiifolia] *Acad. Roy. Sci. Toulouse* 3: 316 (1788)

Ind. loc.: "Dans le Roussillon, aux environs du Boulou, sur les rochers qui bordent le grand chemin"

Jc.: Losa & P. Monts. in *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 10(2): 492 lám. 7 (1953) [sub var. *condensata*]; Malato-Beliz & Cadete, *Cat. Pl. Infest.* 1: 59 tab. 23 (1978)

3. *Paronychia*

Hierba perenne, raramente bienal o anual. Ceba en general c. 7 mm de diámetro, robusta, leñosa. Tallos de hasta 80(110) cm, a menudo difusos, postrados o ascendentes, generalmente robustos y ramosos desde la base. Hojas basales (10)16-40(60) mm, estrechamente obovado-espátuladas, carnosas, con frecuencia en roseta; las caulinares, de (2)6,5-18(30) × (1,5)3-8,5(10) mm, oblongo-lanceoladas, espátuladas u obovadas; estípulas c. 2 mm, ovado-semiauriculadas, frecuentemente de base y margen pardo-purpúreos. Flores (1,2)1,5-2,25 × 1,2-1,5 mm, ovoideas, pediceladas, en glomérulos terminales y subterminales, muy abundantes sobre largas ramas afilas dispuestas en panículas corimbosas. Sépalos 1,2-1,4 × 0,8-1 mm, oval-oblongos, obtusos, con una zona media verde, carnosa, de ovado a ovado-oblonga, y un margen membranáceo casi arqueado que iguala o es algo más estrecho que la parte central. Anteras c. 0,4 × 0,25 mm, anaranjado-amarillentas. Estigmas aplicados. Aquenio 1,3-1,5 × 1,25-1,4 mm, ovoideo-globoso, trígono, muy rugoso, castaño oscuro. $2n = 18$.

Terrenos arenosos y pedregosos, frecuentemente ± ruderalizados, en general silíceos; 0-1900 (2150) m. (II)IV-VIII(IX). Región mediterránea occidental. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica y Menorca. **Esp.:** Ab Al Av (B) Ba Bu (C) Ca Cc Co (CR) Cu Ge Gr Gu H J L Le Lo (Lu) M Ma O Or P PM[(Mn)] (Po) S Sa Se Sg So Te (To) V Va Z Za. **Port.:** todas las provincias.

Observaciones.—Especie muy variable. Se han descrito algunas variedades, entre las que cabe destacar, además de la típica, la var. *annua* (Lange) Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 41 (1968) [*C. telephifolia* f. *annua* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 96 (1866), basión.], caracterizada por ser anual y tener los tallos cortos, y la var. *imbricata* (Lapeyr.) DC., Prodr. 3: 367 (1828) [*C. imbricata* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 169 (1813), basión.]; *C. telephifolia* subsp. *imbricata* (Lapeyr.) Jovet & R. Vilm. ex Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 186 (1982); *C. litoralis* subsp. *imbricata* (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 86 (1974)], con inflorescencias aglomeradas y hojas ± imbricadas.