

5. *Chaetonychia* (DC.) Sweet*

[*Chaetonychia* f. – gr. *chaítē* f. = cabellos flotantes, largos cabellos, larga o espesa cabellera // penacho de un casco; *-onychia*, segundo componente del nombre genérico *Paronychia*. Sin duda por el aspecto de estas plantas; son gráciles, comparativamente al menos]

Hierbas anuales. Hojas opuestas, aunque aparentando con frecuencia ser verticiladas, enteras, cuspidadas, con estípulas. Flores sésiles, pentámeras, hipóginas, sin pétalos, en inflorescencias cimosas, bracteadas. Sépalos 5, libres, muy desiguales; los 3 exteriores mucho más largos que los interiores, cuculados; todos con una arista herbácea subapical. Estilo 1, con un estigma bilobado. Ovario con solo un rudimento seminal, que es anátropo, de inserción lateral. Fruto en aquenio, con pericarpio membranáceo.

1. *Ch. cymosa* (L.) Sweet, Hort. Brit. ed. 3: 263 (1839)

[cymósa]

Illecebrum cymosum L., Sp. Pl.: 206 (1753) [basión.]


Paronychia cymosa (L.) DC. in Lam., Encycl. 5: 25 (1804)

Ind. loc.: “Habitat Monspelii. D. Sauvages”

lc.: Lám. 37

Planta de 3-10(15) cm, grácil. Tallos erectos, a menudo ramificados pseudo-dicotómicamente desde la base, flocoso-pubescentes. Hojas lineares, cuspidadas, aparentemente verticiladas por la presencia de brotes axilares; las mayo-

* C. Soriano Martín



Lám. 37.—*Chaetonychia cymosa*, a-c) Quintana Redonda, Soria (MA 296683), d-f) Bohonal de Ibor, Cáceres (MA 297424), g-k) Parrillas, Toledo (MA 2966684): a) hábito en la antesis; b-c) hojas con estípulas; d-f) infrutescencias y detalles de la misma; g) flor con pedicelo y brácteas; h) sección longitudinal de una flor; i) sépalos exteriores; j) sépalos interiores y pistilo; k) aquenio, en el que se ve la semilla.

6. Illecebrum

res de cada entrenudo 5-6 × c. 0,8 mm; estípulas 1-2 mm, subuladas, escariosas. Inflorescencias en grupos umbeliformes de cimas escorpioideas, glomerulares en la antesis, espiciformes en la fructificación; brácteas más cortas que las flores, escariosas. Sépalos exteriores patentes en la antesis, de 1,5-2,5 mm, con la porción central verde o rojiza, trinerve, y de anchos márgenes escariosos –triangulares en su mitad basal, truncados o auriculados muy cerca de su inserción, cuculado-vesiculosos y blanco-escariosos en la porción apical-; sépalos interiores erectos en la antesis, más estrechos, oblongo-lineares, papiloso-glandulosos en el nervio medio y con una vesícula blanco-escariosa en posición dorsiapical; todos con una arista herbácea subapical, ± uncinada en el ápice, que atraviesa la porción escariosa. Estambres 2-5, insertos en un disco. Ovario ovoideo; estilo muy corto; estigma oscuramente bilobado. Aquenio c. 0,9 × 0,35 mm. $2n = 14$.

Lugares abiertos, en suelos arenosos silíceos; 0-1400 m. (III)IV-VII. Península Ibérica, S de Francia, Córcega, Cerdeña, Marruecos y Túnez. Dispersa de preferencia en la mitad W de la Península, faltando en Baleares. **Esp.:** Av Ba (Bu) (C) Ca Cc Co Cu Gr H (J) (Le) M (Ma) (Or) (Po) Sa (Se) Sg So Te To V Za. **Port.:** todas las provincias. **N.v.:** sanguinaria menuda; *port.:* erva-prata-das-praias.