

## 6. *Illecebrum* L.\*

[*Illecebrum* n. – lat. *illecebra*, -ae f. (*elecebra* y otras lecturas) = nombre de una planta entre los romanos, al parecer un *Sedum*]

Hierbas anuales, glabras, prostradas o ascendentes. Hojas opuestas, enteras, con estípulas pequeñas y escariosas. Flores en cimas axilares, muy brevemente pedunculadas, formando pequeños pseudoverticilos en los nudos, con brácteas pequeñas y escariosas. Sépalos 5, brevemente soldados en la base, ± comprimidos lateralmente, cuculados, aristados –aristas inicialmente ± retorcidas–, de consistencia ± esponjosa, blanquecinos, con la cara interior cóncava, verdusca o rojiza, y la exterior convexa. Estaminodios petaloideos 5 –a veces inexistentes–, mucho menores que los sépalos, sublineares. Estambres 3-5, subhipóginos, unidos por la base a los estaminodios para formar un disco. Ovario pequeño, ovoideo; estilo muy corto, con 2 estigmas capitados. Fruto en aquenio, con pericarpo membranáceo, encerrado en el cáliz, que es persistente. Semilla subelíptica, marrón brillante.

### 1. *I. verticillatum* L., Sp. Pl.: 206 (1753)


[verticillátum]

*Ind. loc.*: “Habitat in Europae pascuis udis”

*lc.*: Lám. 38

Tallos (1)5-30(70) cm, en general ramosos, filiformes, cuadrangulares, generalmente rojizos, enraizantes en los nudos inferiores. Hojas (1)2-6(8) × 1-3 mm, de linear-espatuladas a obovado-redondeadas u ovadas –las inferiores generalmente más estrechas y menores–, atenuadas en la base, subpecioladas, verduscas o rojizas; estípulas c. 1 mm. Cimas 2 por nudo, de 4-6 flores. Sépalos 1,5-2,5 mm. Semilla c. 1 mm.  $2n = 10$ .

\* C. Herrá



Lám. 38.—*Illecebrum verticillatum*, Cangas, península de Morrazo, Pontevedra (MA 197479): a) hábito; b) tallo; c) hoja y estípulas; d) pseudoverticilo; e) flor con bractéolas; f) sección longitudinal de la flor; g) sépalo con estambre y estaminodios petaloideos; h) sección transversal de un sépalo; i) aquenio; j) semilla.

Terrenos silíceos, ± húmedos, con grava o arenosos, a veces flotante en depresiones temporalmente inundadas; 0-1700 m. II-IX. C y W de Europa, rara hacia el S y zonas mediterráneas, N de África, Macaronesia (falta en Cabo Verde). Dispersa principalmente por la mitad W de la Península Ibérica, faltando en las Baleares. **Esp.:** Ab Av Ba (Bi) C Ca Cc Co CR H J Le Lu M Na O Or Po S Sa Se SS To Za. **Port.:** todas las provincias. **N.v.:** *port.:* aranhões.