

7. *Pteranthus* Forssk.*

[*Pteránthus* m. – gr. *pterón* n. = pluma // ala; gr. *ánthos* n. = flor.
Seguramente, por los sépalos, que son alados]

Hierbas anuales. Hojas opuestas –en ocasiones subverticiladas a causa del desarrollo de fascículos axilares subsésiles–, lineares o linear-lanceoladas, enteras; estípulas pequeñas, membranáceas. Flores hipóginas, sin pétalos, ternadas en el ápice de un pedúnculo común dilatado, aplanado, pulverulento-papiloso y hueco, la central fértil, las laterales fértiles o estériles, todas ellas envueltas por ramas estériles con espinas recurvadas. Sépalos 4, libres, persistentes. Estambres 4. Ovario unilocular, ovoideo, estilo corto, filiforme, con 2-3 estigmas recurvados. Fruto en aquenio.

1. *P. dichotomus* Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: [dichótomus]

LXII, 36 (1775)


Ind. loc.: “In desertis Káhirinis florens” [El Cairo]

lc.: Lám. 39

Herbácea, en ocasiones algo suculenta. Tallos 5-15(25) cm, procumbentes o postrado-ascendentes, repetidamente bi o trifurcados, generalmente glabros en la parte inferior y pulverulento-papilosos en la superior; entrenudos de hasta 2,5(3) cm, alargados. Hojas de hasta 20(25) × 1,5(2) mm, sésiles, obtusas o subagudas, atenuadas en la base, glabras; estípulas lanceoladas, laciniadas en los bordes, blancuzcas. Inflorescencias con la flor central fértil, sésil y simétrica; las laterales, fértiles o estériles, sobre un corto pedicelo, asimétricas, involucradas por 4 ramas estériles, simples o ramosas, con las hojas transformadas en espinas recurvadas –las superiores, carentes de estípulas; las inferiores, con estípulas escariosas, fimbriadas en los bordes–. Sépalos 4-5 mm, que se cierran en la madurez y permanecen ± conniventes lateralmente; sépalos externos de la flor central, así como el externo de cada una de las flores laterales, con la base oblongo-linear, cóncava, y el ápice cuculado, en el que nace una arista anchamente alada en la parte inferior y desprovista de ala en la superior, que termina en una espina frecuentemente uncinada; sépalos internos, más pequeños y estrechos, con la arista más corta y más estrechamente alada. Filamentos estaminales alargados, que igualan casi a los sépalos. Estilo bipartido en las poblaciones españolas. $2n = 32^*$.

Zonas arenosas; 100-400 m. IV-VI. SW de Asia –desde Chipre hasta Arabia y el Pakistán–, N de África, SE de la Península Ibérica y Malta, isla ésta en la que es dudosamente nativa. Murcia y Almería. **Esp.**: Al Mu.

* F. Amich



Lám. 39.—*Pteranthus dichotomus*, entre Mazarrón y El Puerto, Murcia (GDAF 6113): a) hábito; b) inflorescencia, más vista lateral del pedúnculo y detalle de su papilosidad; c) flor central de una inflorescencia; d) sépalo exterior; e) sépalo interior; f) sépalos interiores, estambres y pistilo; g) estambres; h) pistilo, vistas frontal y lateral.