

12. *Ortegia* Loefl. ex L.*

[Ortégia f. – Casimiro Gómez Ortega (1741-1818), botánico, boticario y médico nacido en Añover de Tajo (Toledo), fue Primer Catedrático, entre 1771 y 1801, del Real Jardín Botánico, Madrid]

Hierbas perennes. Hojas opuestas, lineares o linear-lanceoladas, con estípulas caducas. Flores pequeñas, hipóginas, sin pétalos, cortamente pediceladas, dispuestas en cimas dicótomas regulares, en ocasiones \pm aglomeradas en espicatos. Cáliz con 5 sépalos, libres, los 2 exteriores algo más cortos y anchos que los interiores. Estambres 3, subhipóginos e incluso en el cáliz. Ovario unilocular, ovoideo; estilo 1, filiforme; estigma de oscuramente tridentado a brevemente trifido en el ápice. Cápsula dehiscente por 3 valvas, con semillas numerosas.

1. *O. hispanica* Loefl. ex L., Sp. Pl.: 560 (1753)


[hispanica]

Ind. loc.: “Habitat in Castilia Minuart, Baetica Velez, Salmantica”

Ic.: Lám. 46

Planta \pm glauca, con cepa leñosa. Tallos de hasta 30(60) cm, de aspecto junciforme, erectos –raramente postrados–, muy ramificados desde la base, con ramas rígidas, angulosas, a menudo fuertemente escábridas en la parte superior. Hojas 5-15(20) \times 1-2 mm, más cortas que los entrenudos, sésiles, enteras, aquilladas, glabras, con frecuencia escábridas en el margen; estípulas escariosas, casi setáceas, hinchadas basalmente en una glándula persistente, purpúrea. Brácteas florales escariosas, linear-lanceoladas, de margen y quilla escábridos y 2 pequeñas glándulas purpúreas en su base. Sépalos 2-2,5(3) mm, ovado-lanceolados, \pm agudos, aquillados y escábridos en la quilla, verduscos, de ancho margen escarioso, habitualmente sublaciniado. Semillas pequeñas, fusiformes, meladas. $2n = 18$.

* F. Amich



Lám. 46.—*Ortega hispanica*, Corporario, Salamanca (MA 256576): a) hábito; b) nudo; c) inflorescencia; d) flor; e) flor terminal; f) pistilo y androceo con sépalo; g) carpelo con rudimentos seminales; h) cápsula con perianto; i) semillas.

Terrenos incultos, viaria o segetal, en suelos arenosos, silíceos; 300-1500 m. V-VIII. ● W de la Península Ibérica, faltando en las zonas litorales norteñas y en el tercio S; señalada como adventicia en Argelia (Mascara) e Italia (Piamonte), parece que en la actualidad ha desaparecido de tales países, ya que desde hace siglo y medio no ha vuelto a ser recolectada; si hay una recolección moderna de las Landas francesas, donde puede ser de introducción reciente. **Esp.:** Av Ba Cc (Co) Gu (Le) Lu M Or S Sa Sg So To (Va) Za. **Port.:** AA1 BA BB BL (Mi) TM. **N.v.:** hierba juncosa, hierba de la sangre.