

## 17. Rhodalsine Gay\*\*

[Rhodálsine f. – gr. *rhódon* = rosa; gr. *alsínē*; lat. *alsine*, *-es* = nombre de una planta (según algunos autores una parietaria, según otros *Thelygonum cynocrambe* o una pamplina –*Stellaria* sp.–); Dioscórides y Plinio indican que la *alsine* debe su nombre a que crece en los bosques (gr. *álsos* = bosque). El género que nos ocupa tiene las flores en general rosadas]

Hierbas perennes de cepa leñosa. Tallos procumbentes, poco lignificados, muy ramosos. Hojas opuestas, linear-lanceoladas o lineares, sin estípulas. Flores hipóginas, en inflorescencias cimosas, terminales o laterales. Sépalos 5, soldados en la base, herbáceos. Pétalos 5, subiguales, rosados o blancos por excepción. Estambres 10, en 2 verticilos, el interior inserto en un disco subpentagonal. Ovario brevemente estipitado; estilos 3, filiformes. Cápsula dehiscente hasta su

\*\* C. Favarger & P. Montserrat

18. *Minuartia*

mitad por 3 valvas. Semillas orbicular-reniformes, comprimidas, de caras algo cóncavas y dorso canaliculado, sin estrofiolo; radícula embrional acumbente.

1. **Rh. geniculata** (Poir.) F.N. Williams in Bull. [geniculáta]  
Herb. Boissier 6: 7 (1898)

*Arenaria geniculata* Poir., Voy. Barbarie 2: 166 (1789) [basión.]

*Alsine procumbens* (Vahl) Fenzl, Vers. Darstell. Alsin., tab. ad pag. 57 (1833), nom. illeg.


*Minuartia geniculata* (Poir.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 232 (1912)

*Ind. loc.*: "J'ai recueilli cette espèce en Barbarie, dans les environs de la Calle, où elle croît dans le sable, sur les bords de la mer" [sec. Poir. in Lam., Encycl. 6: 366 (1804)]

*Ic.*: Lám. 64

Tallos 10-40(70) cm, geniculados, acostados hasta la inflorescencia, glandulosos. Hojas 5-10(30) × (0,8)1-2(4) mm, verde-grisáceas, con pelos glandulosos; las de los fascículos axilares más cortas. Flores en cimas terminales laxas, más algunas laterales paucifloras; pedicelos mucho mayores que los sépalos –en la flor central hasta 4-6 veces–. Brácteas menores que las hojas, ovales, foliáceas. Sépalos 3-4(5) mm, subiguales, acrescentes, lanceolados u oblongo-lanceolados, obtusos, de reborde membranáceo amplio y 1(3) nervios poco aparentes, generalmente solo apreciables en su cara interior. Pétalos de igual longitud o poco más cortos que los sépalos –rara vez mayores–, anchamente ovados. Estambres con anteras de hasta 0,6-0,8 mm. Estilos c. 1 mm. Cápsula subigual a los sépalos, ovoidea, membranácea. Semillas 0,5-0,8 mm, de caras sublitas y dorso verrucoso, castaño-oscuro.  $2n = 18^*$ ,  $n = 9$ .

Ruderal, propia de ambientes áridos próximos al mar o de sitios muy soleados, arenosos, pisoteados, poco fríos en invierno; 0-400(600) m. (X-I)II-V(VI). Región mediterránea, principalmente en su mitad S. y Canarias. Zonas litorales o sublitorales mediterráneas desde Valencia hasta Huelva, Mallorca y Sines (Baixo Alentejo); citada de los alrededores de Setúbal por P. Cout.; al parecer introducida accidentalmente y extinta en Barcelona. **Esp.**: A Ab Al [B†] Ca Gr H Ma Mu PM[Mil] Se V. **Port.**: BA1 (E)?



Lám. 64.—*Rhodalsine geniculata*, Játiva, Valencia (MA 35740): a) hábito; b) tallo con hojas; c) detalle de un nudo de la inflorescencia; d) flor; e) diagrama floral; f) pistilo; g) cápsula; h) semilla.