


30. Cucubalus L.*

[Cucúbalus m. – lat. *cucubalus*, -i (*cuculus*, -i y otras variantes) = nombre de una planta que en Plinio es sinónimo de gr. *strýchnon*. Al parecer, entre otras, la hierba mora (*Solanum nigrum*) y tal vez el cucúballo]

Hierbas perennes. Hojas decusadas, sin estípulas. Flores hermafroditas, hipóginas, en dicasios laxos, paucifloros, con brácteas foliáceas. Cáliz de 5 sépalos soldados, anchamente acampanado, coronado por 5 dientes largos, con nervios comisurales. Pétalos 5, \pm diferenciados en uña y lámina. Estambres 10. Ovario trilocular en la base, unilocular en el resto; estilos 3, filiformes. Fruto indehiscente, \pm carnoso, bacciforme en la madurez, con carpóforo. Semillas numerosas, reniformes.

* I. Nogueira



Lám. 118.—*Cucubalus baccifer*, Huerta del Marquesado, Cuenca (MA 204532): a) hábito; b) flor; c) sección longitudinal de la flor; d) pétalo con estambre; e) fruto, con cáliz persistente y carpóforo; f) semillas.

31. *Gypsophila*1. *C. baccifer* L., Sp. Pl.: 414 (1753)

[báccifer]

Ind. loc.: "Habitat in Tatariae, Germaniae, Galliae, Italiae nemoribus"*lc.*: Lám. 118

Planta pubescente, con rizoma rastrero. Tallos de hasta 1,5 m, finos, difusos, rastreros o trepadores. Hojas 2-9,5 × 2-4,5 cm, cortamente pecioladas, de ovado-acuminadas a lanceoladas, mucronadas, enteras o ligeramente sinuadas. Flores c. 1,5-2 cm de diámetro, cortamente pediceladas. Cáliz 8-15 mm, inflado-acampanado, con 10 nervios, persistente en la fructificación; dientes tan largos como el tubo, lanceolados, obtusos, revueltos en la madurez. Pétalos largamente exertos, blanco-verdosos; lámina estrechamente espatulada, bífida. Fruto 6-8 mm de diámetro, globoso, blanco-amarillento cuando joven, negro y brillante en la madurez, carpóforo 2-3 mm. Semillas c. 1,5 mm, lisas en la madurez, negras. $2n = 24$.

Bosques, principalmente caducifolios y ribereños, fuentes, setos, alrededores de huertos, etc., en terrenos húmedos y sombríos; 0-1200 m. IV-X. C y S de Europa, llegando a través de Asia continental hasta el Japón. Dispersa por casi toda la Península Ibérica, si bien más rara en la mitad meridional, faltando prácticamente en el S (excepto en Granada). **Esp.**: Av B Bu Cc Co Cs Cu Ge Gr Hu (L) Le Lo M Na (O) (Or) P (Po) (S) Sa Sg So SS Te To V Va Vi Z Za. **Port.**: BA BB BL DL (E) Mi TM. **N.v.**: cucúballo, tomates del diablo, uvas del diablo, belladona falsa, belladona silvestre, purgacabras, oreja de vecino, pamplina de bayas, colleja (Granada); *cat.*: herba de la mala llavor.

Se ha utilizado como astringente; y su tisana, como antipirética y antihemorrágica.