


36. Velezia L.*

[Velézia f.–Cristóbal (Christobal) Vélez (c. 1710-1753), boticario y botánico conquense establecido en Madrid, anfitrión de Loefling y corresponsal de Linneo]

Hierbas anuales. Tallos erectos o ascendentes, generalmente ramificados dicotómicamente desde la base. Hojas opuestas, enteras, sin estípulas. Flores her-

* L. Villar



Lám. 136.—*Velezia rigida*, a) Bicorp, Valencia (MA 34012); b-j) Almenara de Tormes, Salamanca (MA 220711); a-b) hábito; c) nudo y detalle de los cilios de la hoja; d) inflorescencia, con detalle de la glandulosidad del cáliz; e) sección longitudinal de una flor; f) dientes del cáliz en vista adaxial; g) pétalo y estambre; h) sección longitudinal del ovario mostrando los rudimentos seminales; i) cápsula; j) semillas.

36. Velezia

mafroditas, hipóginas, generalmente en inflorescencias cimosas, sin epicáliz. Cáliz de 5 sépalos soldados, tubular, con c. 15 nervios, coronado por 5 dientes, sin nervios comisurales, siendo las comisuras \pm herbáceas. Corola de 5 pétalos diferenciados en uña y lámina, con corona de pelos triangulares. Estambres 10(5). Estilos 2, filiformes. Fruto en cápsula, cilíndrica, estrecha, dehiscente por 4 dientes apicales, con carpóforo muy corto. Semillas poco numerosas, escutiformes, apiculadas, de margen involuto e hilo facial.

1. V. rigida Loefl. ex L., Sp. Pl.: 332 (1753)

[rígida]

Ind. loc.: "Habitat in Europa australi"*lc.*: Lám. 136

Planta pubescente-glandulosa –pelos c. 0,2 mm–, de color verdusco o rojizo. Tallos (2)8-30(56) cm, \pm rígidos, con los nudos bien marcados. Hojas con 3-5 nervios, ciliadas; las basales, de hasta 15 \times 2(3) mm, aproximadas en roseta, linear-espatuladas; las caulinares, 15-22 \times 1-2 mm, lineares o linear-lanceoladas, soldadas en la base, de margen membranáceo. Flores solitarias o geminadas en la mayor parte de los nudos, sobre pedicelos de 1-2 mm, relativamente gruesos. Cáliz 10-12(14) \times 1 mm, estrechamente cilíndrico; dientes 1-2 mm, estrechamente triangulares. Pétalos contiguos; lámina 1,5-3 mm, oblonga, de emarginada a bilobada, con lóbulos subagudos, rosado-purpúrea, barbuda en la garganta; uña blanca, muy estrecha, igualando al cáliz. Cápsula algo más corta que el cáliz. Semillas c. 1,5 mm, negras, rugulosas. $2n = 28$.

Pastos, orillas de campos de labor, claros de bosque, etc.; en suelos arenosos o pedregosos, poco profundos y \pm secos; 0-1400(2000) m. (IV)V-VI(VII). Región mediterránea, hasta el Cáucaso y región irano-turana. Casi toda la Península Ibérica, faltando en el S y NW de Portugal, gran parte de Galicia y litoral cantábrico. **Esp.**: A Ab Al (Av) B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs (Cu) Gr Gu (H) Hu J L Le Lo M Ma Mu Na Or (P) S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. **Port.**: AAl (Ag)? (BA) BAl BB (BL) (DL) E R TM. **N.v.**: clavelito seco, clavelito borde.