


3. **Patellifolia** A.J. Scott, Ford-Lloyd & J.T. Williams*

[*Patellifolia* f. – lat. *patella*, -ae f. = plato pequeño; lat. *folium*, -ii n. (*folia*, -ae f. en Isidoro) = hoja. *Patellifolia* es nombre que sustituye a *Patellaria* y éste, al parecer, proviene de la sect. *Patellares* del género *Beta*, que engloba, entre otras, a *B. patellaris*; en esta especie, según su creador, el epíteto alude a la base del fruto]

Anuales o perennes, herbáceas, erectas o decumbentes. Tallos no articulados. Hojas alternas pecioladas, cordiformes o hastadas. Inflorescencia espiciforme, compuesta de cimas paucifloras (1-3 flores), axilares, con brácteas seme-

* A.M. Gutiérrez Bustillo



Lám. 142.—*Patellifolia patellaris*, Islas Columbretes, Castellón (MA 348827): a) hábito; b) flor; c) flor en sección longitudinal; d) fruto; e) fruto abierto mostrando el opérculo; f) fruto seccionado mostrando la semilla.

4. *Chenopodium*

jantes a las hojas. Flores hermafroditas. Perianto pentámero, formado por piezas herbáceas, ligeramente carinadas y soldadas en la base. Estambres 5, oposititépales, con los filamentos soldados en la base en un disco carnosos. Ovario semiínfero, soldado con el receptáculo y engrosándose en la fructificación. Frutos solitarios, subesféricos, caducos en la madurez y dehiscentes por medio de un opérculo. Semillas verticales; perisperma abundante; embrión anular.

Bibliografía.—J.T. WILLIAMS, A.J. SCOTT & B.V. FORD-LLOYD in Feddes Repert. 87: 289-292 (1976); A.J. SCOTT, B.V. FORD-LLOYD & J.T. WILLIAMS in Taxon 26: 284 (1977).

1. ***P. patellaris*** (Moq.) A.J. Scott, Ford-Lloyd [patelláris]
& J.T. Williams in Taxon 26: 284 (1977)

Beta patellaris Moq. in DC., Prodr. 13(2): 57 (1849) [basión.]

B. diffusa Coss., Not. Pl. Crit.: 178 (1852)

Ind. loc.: "In ins. Canariensium littoribus, rara (Bourg.!)"

lc.: Lám. 142

Herbácea, anual o bienal. Tallos procumbentes u ocasionalmente erectos, simples o con ramificaciones secundarias muy cortas, foliosos hasta el ápice. Hojas carnosas, con la lámina de 1,5-4 × 1-3,5 cm, triangular u ovada, a veces subróbica, de base cordata, atenuada en el pecíolo. Flores en cimas axilares de 1-3 flores, laxas casi desde la base. Perianto pentámero, con tépalos de ápice inflexo y un apéndice subapical, pequeño, triangular, situado en el dorso. Estambres opuestos a los tépalos y soldados por su base en un disco carnosos dando un nectario orbicular. Frutos 2,5-4 × 3-5 mm, solitarios, caedizos, esféricos o subesféricos. $2n = 18^*$, 36^* .

Acantilados y arenales litorales. I-XII. Macaronesia, N de África y Península Ibérica. Mallorca, E, S y SW de la Península. **Esp.**: Al Cs Gr Mu PM[Mil]. **Port.**: (Ag) (E). **N.v.**: tebete.