

8. *Halimione* Aellen*

[Halimióné f. – gr. *hálimon* (*hálimos*); lat. *halimon*, -i n. (*halimus*, -i m.) = orgaza; bot. *Obione* f. = género creado por Gaertner haciendo alusión, al parecer, al río Obi –en Siberia–, región donde se cría su *Obione muricata*. El género *Halimione*, nom. subst. para *Halimus* Wallroth, está relacionado con *Obione*]

Perennes, leñosas, monoicas. Tallos no articulados. Hojas opuestas. Inflorescencia cimosa, paniculiforme. Flores unisexuales; las masculinas ebracteoladas y con perianto de 4-5 piezas (tépalos) sin apéndices; las femeninas con 2 bractéolas acrescentes y sin perianto. Bractéolas fructíferas soldadas en gran parte de su longitud, pero con ápice libre. Semilla vertical; perisperma farináceo; embrión anular.

Bibliografía.–P. AELLEN in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 118-130 (1938).

1. *H. portulacoides* (L.) Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 126 (1938) [portulacoídes]

Atriplex portulacoides L., Sp. Pl. 2: 1053 (1753) [basión.]

Obione portulacoides (L.) Moq., Chenop. Monogr. Enum.: 75 (1840)


Ind. loc.: “Habitat in Oceani: Europae septentrionalis littoribus” [sic]

lc.: Lám. 151

Arbustillo de hasta 1,5 m de altura, leñoso en la base y herbáceo en la parte superior, lepidoto o farináceo. Tallos radicales, prostrados o erecto-patentes, subangulosos. Hojas (20)30-50(60) × (2)3-6(16) mm, opuestas, de espatuladas o lanceoladas a linear-lanceoladas, excepcionalmente deltoides, atenuadas en pecíolo claro. Flores agrupadas en espigas laxas que en su conjunto forman una inflorescencia paniculiforme. Bractéolas fructíferas 2-4 × 2-4 mm, muy variables, obdeltoides, raramente cuadrangulares, con un apéndice triangular en el ápice y dos lóbulos laterales manifiestos, sésiles o pediceladas, con el dorso desde liso a enteramente cubierto de apéndices obtusos. $2n = 18^*$, 36; $n = 18$.

Marismas, terrenos salinos y encharcados, en el litoral, muy raramente en suelos salinos del interior. VIII-XI. Costas del Mediterráneo, del Atlántico europeo, norteamericano y África austral. Dispersa por las costas peninsulares. **Esp.:** A Al B Bi C Ca Cs Ge Gr H (Hu) (Lu) Ma Mu O

* S. Castroviejo



Lám. 151.—*Halimione portulacoides*, marismas de Huelva (MA 28923): a) rama florífera; b) ápice de la inflorescencia; c) flor masculina; d) detalles de una flor femenina en diferentes estados de desarrollo y desprovista de una bractéola; e) bractéolas fructíferas.

9. Krascheninnikovia

PM[Mil Mn Formentera] Po S Se SS T V. **Port.:** Ag BA1 BL E. **N.v.:** verdolaga marina, cenizo blanco, sabonera, sayón, salobreña, obione; *cat.:* salat portulacoide.

Observaciones.—Atendiendo al tamaño de sus bractéolas fructíferas y al tipo de ornamentación de las mismas, han sido descritas numerosas variedades, de las que se mencionaron explícitamente para la Península: var. *laevis* Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 127 (1938) —incluyendo algunas formas— y var. *appendiculata* Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 128 (1938). Todas ellas parecen tener muy escaso valor taxonómico, ya que sus caracteres no aparecen ligados ni a un área ni a un hábitat concreto.