

15. *Arthrocnemum* Moq.*

[*Arthrocnemum* n. – gr. *árrhron* n. = articulación; gr. *knénē* f. = pantorrilla, pierna // entrenudo. Por sus tallos articulados]

Arbustillos leñosos en la base. Tallos articulados, segmentos carnosos, de color verde, rojizos o blanquecino-cenicientos. Ramas fértiles generalmente más cortas que las estériles. Hojas opuestas, soldadas en su base y al tallo, dando lugar a un artejo, con la lámina foliar reducida a una escama aguda que se observa en su parte superior. Brácteas similares a las hojas, formando los artejos fértiles. Flores hermafroditas, ternadas, en cimas opuestas e incrustadas en la parte inferior de cada segmento fértil, sin tabique de separación, por lo que al desprenderse el fruto en la madurez queda un hueco único por cada cima. Perianto formado por 4 tépalos soldados, carnosos. Estambres 2. Ovario súpero, estigmas 2. Fruto semioculto por el perianto fructífero que se hace esponjoso; pericarpo membranoso. Semillas verticales, finamente reticuladas; perisperma abundante; embrión dorsal, arqueado.

Bibliografía.—S. CASTROVIEJO & P. COELLO in *Anales Jard. Bot. Madrid* 37: 41-73 (1980).

1. *A. macrostachyum* (Moric.) Moris in Moris & Delponte, [*macrostáchyum*] *Enum. Sem. Hort. Taur.* [1854]: 35, t. 2 (1854)

Salicornia macrostachya Moric., *Fl. Venet.*: 2 (1820) [basión.]


Ind. loc.: “Hab. secus viam quae ad portum Malamocco ducit, praecedentibus rarior”

lc.: Lám. 157

Arbustillo de hasta 150 cm, erecto o, con menos frecuencia, postrado-radicante. Ramas articuladas, con artejos ciatiformes que finalizan con un reborde membranoso hialino. Ramas fértiles cilíndricas, crasas, terminales o axilares, solitarias o agrupadas en inflorescencia paniculiforme. Flores en cimas trifloras, semiocultas por el reborde del artejo inferior; la central ligeramente mayor que las laterales, dispuestas las tres casi a la misma altura. Semilla negra, brillante; testa dura. $2n = 36$; $n = 18$.

Saladares de la costa o del interior y marismas; 0-800 m. IV-IX. Región mediterránea y comarcas vecinas. Región mediterránea peninsular y las Baleares. **Esp.:** A Ab Al Ca Cs Ge H L M Ma Mu PM[Mil Mn Ib Formentera] Se T To V Z. **Port.:** Ag BAI BL E. **N.v.:** alacranera, garbancillo, solicuernos, sapillo, sosa jabonera, tarafina, sapina, almajo; *cat.:* salsones, cirialeras, ballaster, sosa dura, mamelluts, cirialera glauca, sosa grossa.

* S. Castroviejo



Lám. 157.—*Arthrocnemum macrostachyum*, Villamejor, Aranjuez, Madrid (MA 282600): a) rama florífera; b) ramilla estéril; c) ramilla fértil; d) segmento fértil mostrando la cima triflora; e) segmento maduro mostrando el hueco único dejado por el conjunto fructífero; f) flor inmadura; g) sección de botón floral; h) sección de flor en la antesis; i) sección de flor en la madurez; j) semilla; k) sección de semilla.