

18. *Microcnemum* Ung.-Sternb.*

[*Microcnemum* n. – gr. *mikrós* = pequeño; gr. *nēmē* f. = pantorrilla, pierna // entrenudo. Por sus cortos entrenudos]

Anuales, crasas, erectas. Tallos articulados. Hojas opuestas, soldadas lateralmente. Flores reunidas en cimas trifloras, sésiles, agrupadas en inflorescencias espiciformes terminales; flor central hermafrodita; las laterales femeninas. Perianto de una sola pieza. Estambre 1. Ovario súpero; un carpelo, piriforme; estilo simple o dividido en el ápice en 2 ramas estigmáticas divaricadas. Semillas verticales, subreniformes; perisperma nulo o muy escaso.

Bibliografía.—J. MOLERO in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 327-336 (1986).

1. *M. coralloides* (Loscos & J. Pardo) Buen in Anales Soc. [coralloídes] Esp. Hist. Nat. 12: 431 (1883) subsp. **coralloides**


Arthrocnemum coralloides Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon: 90 (1863) [basión.]
M. fastigiatum Loscos & J. Pardo ex Ung.-Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze 1874: 280 (1876), nom. illeg.

Ind. loc.: “Hab. ad ripas orientales lacunae Laguneta de Chiprana et prope Caspe in loco los Pallaruelos, ubi in solo salsuginoso et sterili crescit, sed rara est”

lc.: Lám. 160

Glabra, glauca, ligeramente pruinosa. Tallos (2)3-10(12) cm, erectos, ramificados desde la base, a veces subsimples. Hojas de 2-3 mm, decusadas, embudado-amplexicaules, con ápice triangular agudo; margen hialino, estrecho. Entrenudos basales de longitud 3-5 veces mayor que la de los artejos estériles. Inflorescencia articulada, con artejos fértiles muy parecidos a las hojas, apretados, conteniendo dos cimas trifloras, opuestas, insertas en pequeñas cavidades del tallo y axila de cada bráctea. Flores semiocultas tras los bordes de los artejos; la central hermafrodita, proterandra. Perianto estrechamente ovoide, membranoso, hialino. Estambre inserto en la base del ovario; anteras amarillas, exertas en la anthesis. Estilo flexuoso. Fruto monospermo, protegido por una mem-

* J. Molero



Lám. 160.—*Microcnemum coralloides* subsp. *coralloides*, entre Bujaraloz y Sástago, Zaragoza (BC s.n.): a) hábito de una forma enana; b) hábito más común; c) ápice de una ramilla florífera; d) sección de los artejos apicales de una ramilla florífera; e) fragmento de una ramilla fructífera; f) sección de un artejo mostrando una cima triflora; g) detalle de una flor; h) detalle del gineceo; i) detalle del fruto; j) semilla; k) sección de la semilla.

19. Suaeda

brana utricular muy tenue, que se abre. Semilla 0,8-1,1 × 0,5-0,7 mm, con testa negra, granular, brillante, glabra. $2n = 18$.

Saladares del interior con clima continental, seco y soleado, en poblaciones aisladas; 200-700 m. VI-IX. Región mediterránea occidental. C de la Península, valle del Ebro y depresión de Guadix.
Esp.: Ab Cu CR Gr Hu L M Na Te To Va Z.