

21. *Anabasis*21. *Anabasis* L.*

[Anábasis f. – gr. *anábasis* = ascensión, subida // nombre de una planta trepadora, afila; en Plinio y Dioscórides, sinónimo de *éphedra* e *híppuris*]

Sufrútices. Ramas articuladas. Hojas opuestas, amplexicaules, soldadas entre sí y con el tallo, formando un artejo; lámina foliar reducida a una escamilla. Brácteas similares a las hojas. Inflorescencias espiciformes. Flores axilares, hermafroditas o femeninas, pentámeras, 2-bracteoladas. Piezas del perianto 5, libres, de ordinario con un ala transversal en la fructificación. Estambres 5, sin apéndices, soldados en la base, en un disco hipógeno o “disco estaminal”. Estaminodios 5, alternos con los estambres, reducidos a lóbulos oblongos o semiorbiculares. Ovario súpero; estigmas 2. Fruto bacciforme. Semilla vertical, comprimida paralelamente al eje de la inflorescencia; perisperma nulo; embrión espiral.

1. *A. articulata* (Forssk.) Moq. in DC., [articuláta]
Prodr. 13(2): 212 (1849)

Salsola articulata Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 55 (1775) [basión.]


Ind. loc.: “In arena mobile circa Pyramides” [Egipto]

lc.: Lám. 165

Arbustillo de hasta 50 cm. Ramas cortas y a su vez muy divididas; las más viejas, de color glauco-ceniciento; ramillas de 1,5-4 mm de grosor, verde-pálidas o verdoso-amarillentas, netamente articuladas, frágiles; artejos generalmente escariosos en su borde superior, cuya cara cóncava es vilosa. Hojas opuestas, amplexicaules y soldadas entre sí y con el tallo formando el artejo; lámina reducida a una simple escamilla escariosa y aguda. Bractéolas 2, más cortas que el perianto, agudas, pubescentes. Flores de hasta 5 mm, axilares, opuestas –o con menos frecuencia subverticiladas–, agrupadas en inflorescencia espiciforme en la parte superior de las ramillas. Piezas periánticas escariosas, oblongas, obtusas o agudas, 2 externas y 3 internas; en la fructificación pueden no modificarse o desarrollar un ala transversal (sea en todas ellas sea solamente en las externas o las internas) dando al conjunto de la planta un bello color rojizo metálico. Ovario pubescente o papiloso; estilo corto; estigmas erectos o recurvos. Fruto de pericarpo carnoso, ± adherente a la semilla. $2n = 18^*$.

Cerros yesosos, arcillosos, salinos o subsalinos; piso basal. VIII-XI. España y desde el Magreb al Líbano. Sureste árido ibérico. **Esp.**: A Al Gr Mu.

* S. Castroviejo



Lám. 165.—*Anabasis articulata*, entre Muchamiel y Jijona, Alicante (MA 412155): a) hábito; b) rama fructífera; c) detalle de una ramilla mostrando los artejos; d) detalle del artejo apical; e) artejo medio y detalle de los pelos axilares; f) sección vertical de una flor en la madurez; g) disco estaminal con estambres y estaminodios; h) flor en la madurez; i) flor en la madurez mostrando las bractéolas; j) bractéola; k) pieza periántica alada en visión frontal; l) pieza periántica alada en visión lateral; m) fruto.