


22. **Hammada** Iljin*

[Hammáda f. – etimología desconocida; Iljin, que inventó el nombre genérico, no explicó nada al respecto]

Arbustillos o sufrútices. Tallos articulados. Ramillas de hasta 1,5 mm de grosor, de postradas a ascendentes, de color verde oscuro; las floríferas nacen de los renuevos verdes del año o de los entrenudos superiores de los tallos.

* S. Castroviejo



Lám. 166.—*Hammada articulata*, Gérgal, Almería (MA 395797): a) rama fructífera; b) detalle de una ramilla joven; c) detalle de una ramilla fructífera; d) bractéola; e) pieza periántica alada en visión frontal; f) pieza periántica alada en visión lateral; g) flor en corte vertical; h) flor en la madurez; i) flor con bractéola y detalle de un estambre; j) detalle del disco hipógino desarrollado, con los filamentos, estilo y estigmas; k) detalle del gineceo; l) embrión.

23. **Halogeton**

Hojas opuestas, soldadas entre sí y con el tallo para formar un artejo. Inflorescencia paniculada. Brácteas foliosas, escumiformes. Flores pentámeras, hermafroditas, bracteoladas, solitarias, en la axila de una bráctea. Perianto de 5 piezas, aladas en la madurez. Estambres 5, insertos sobre el disco hipógeno o “disco estaminal”, sin apéndices o cortamente apendiculados; sin estaminodios. Ovario súpero; estigmas 4. Fruto bacciforme, subcarnoso. Semillas horizontales; perisperma nulo; embrión espiral.

1. *H. articulata* (Moq.) O. Bolòs & Vigo in Buttl. [articuláta]
Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 89 (1974)

Caroxylon articulatum Moq. in DC., Prodr. 13(2): 175 (1849) [basiòn.]

Salsola articulata Cav., Icon. 3: 43, tab. 284 (1794), non Forssk. [syn. subst.]

Haloxylon articulatum (Moq.) Bunge in Mém. Acad. Imp. Sci. St. Pétersbourg 7: 468 (1851)

Ind. loc.: “Vidi floridam ad vias prope Eldam, Agost et Noveldam mense Julio”

lc.: Lám. 166

Arbustillo de hasta 70 cm, erecto. Ramas y ramillas estriadas, las de último orden, de color verde oscuro; las más viejas, con un ritidoma caduco que les da un color pardo-ceniciento. Hojas opuestas, amplexicaules, formando un artejo, con lámina de hasta 2 mm, triangular-subulada, carnosita. Flores hermafroditas, opuestas. Piezas periánticas con ala ovado-redondeada, subestriada y de color que varía del rosado al pardo claro. Estigmas divergentes, revolutos, papilosos por su cara interna. Fruto redondeado, $\pm$ comprimido; pericarpo no adherente. $2n = 18^*$.

Colinas margosas, salinas o subsalinas, siempre muy soleadas; piso basal. VII-XII. Península Ibérica y N de África. Sudeste árido ibérico y valle del Guadiana Menor. **Esp.**: A Al Gr J Mu. **N.v.**: barrilla tamojo, tamojo, matojo; *cat.*: salat articulat.

Observaciones.—La planta del N de África ha sido llamada *H. scoparia* (Pomel) Iljin in Bot. Žurn. (Moscú & Leningrado) 33: 583 (1948) [*Haloxylon scoparium* Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.: 335 (1875), basión.], pero su independencia taxonómica parece dudosa.