

1. *Achyranthes* L.*

[Achyrántes f. – gr. *áchyron* n. = paja; gr. *ánthos* n. = flor. Por el tacto pajizo de sus tépalos y bractéolas]

Perennes, erectas. Hojas enteras, opuestas, pecioladas. Inflorescencias en espigas terminales estrechas y de longitud apreciable. Flores hermafroditas solitarias, con una bráctea y 2 bractéolas, frecuentemente reflejas en la madurez. Tépalos 4-5, prácticamente libres, estrechamente lanceolados, agudos, duros y espinescentes en la fructificación, al igual que las referidas bractéolas. Estambres 2-5 alternando con pseudoestaminodios; filamentos soldados en la base en una cúpula membranácea. Pistilo con estilo filiforme terminado en un pequeño estigma capitado. Fruto indehiscente, rodeado por los tépalos.

Observaciones.—*A. aspera* L., Sp. Pl.: 204 (1753), se incluye en la clave, pero no se describe; ya que, aunque ha sido citada de España, su presencia en la Península no parece haberse confirmado.

Bibliografía.—A. CAVACO in Mém. Mus. Natl. Hist. Natl. Paris, Sér. B, Bot. 13: 112-129 (1962).

1. Hojas cortamente acuminadas, verdes por ambas caras; flores de más de 5 mm de longitud *A. aspera*
- Hojas en general largamente acuminadas, plateadas por el envés; flores de 3,5 a 5 mm de longitud **1. A. sicula**

1. A. sicula (L.) All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 41 (1773) [sícula]

A. aspera var. *sicula* L., Sp. Pl. 1: 204 (1753) [basión.]

A. argentea Lam., Encycl. 1: 545 (1785)


Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Zeylona, Jamaica”

lc.: Lám. 168

Sufruticosa. Limbos foliares 2-6 × 1-3 cm, de ovales a elíptico-lanceolados, en general ampliamente acuminados, con tomento sedoso-plateado en el envés. Flores reflejas en la madurez. Tépalos de 3,5-5 mm. Brácteas y bractéolas más cortas que los tépalos. Estambres 5. Pseudoestaminodios fimbriados, con lacinias que no llegan a la altura de las anteras.

Preferentemente en comunidades nitrófilas. III-VI. Regiones tropicales de Asia y África. Naturalizada en el Mediterráneo, Australia y S de África. S de España. **Esp.:** [Ca] [Gr] [Ma].

* J.L. Carretero



Lám. 168.—*Achyranthes sicula*, Los Barrios, Cádiz (BC 109713): a) hábito; b) fragmento de la inflorescencia terminal; c) flor inmadura con bráctea, bractéolas y perianto; d) androceo inmaduro y gineceo; e) estambre con antera madura y pseudoestaminodios; f) gineceo y sección del androceo; g) sección del ovario; h) sección del fruto mostrando la semilla inmadura.