

3. *Reynoutria*3. *Reynoutria* Houtt.*

[*Reynoutria* f. – Barón van Reynoutré (fl. siglo XVI), quien, según Lobelius, era gran amante de las plantas y no ahorró gastos para hacerlas dibujar]

Perennes, herbáceas, rizomatosas. Tallos aéreos erectos, anuales. Hojas alternas, pecioladas, cordadas o truncadas en la base. Inflorescencias paniculadas, con fascículos de 2-5 flores. Flores funcionalmente unisexuales, las femeninas con estaminodios y las masculinas con el ovario abortado. Perianto de 5 piezas, persistentes en la fructificación; las 3 externas, aquilladas o aladas en la fructificación. Estambres 8. Estilos 3, largos; estigmas fimbriados. Aquenios trígonos.

Bibliografía.—J. Izco in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol. 72: 25-28 (1974).

1. *R. japonica* Houtt., Nat. Hist. 2(8): 640, pl. 51 (1777)

[japónica]


Ind. loc.: "Japaniche"

lc.: Lám. 175

Tallos 2-3 m. Hojas 5-14 × 3-13 cm, anchamente ovadas, truncadas en la base, esparcidamente glandulosas. Inflorescencias laxas y glandulosas; pedicelos florales articulados en su mitad superior. Perianto decurrente, blanquecino, con las piezas externas anchamente aladas en la fructificación. Estambres de filamentos ensanchados en su base. Aquenios c. 4 × 2 mm, negros. $2n = 34^*$, 44^* , 88^* ; $n = 10^*$, 11^* .

Setos y bordes de caminos, en zonas bajas y húmedas; nitrófila. VIII-IX. Originaria del Japón, cultivada como ornamental y subespontánea en Europa. N de la Península Ibérica. **Esp.:** [Bi] [L] [Na] [O] [(Po)] [S] [SS]. **Port.:** [(DL)] [Mi].

* C. Navarro



Lám. 175.—*Reynoutria japonica*, a, g-i) Sama, Langreo, Asturias (Herb. J. Izeo n.º 194203); b-f) Bas-Rhin, Francia (BC 648901): a) parte de una rama fructífera; b) porción terminal de una inflorescencia; c) fascículo de 2 flores; d) flores femeninas abiertas; e) estilos y estigmas; f) estambres; g) eje de la inflorescencia, ócrea y fruto; h) detalle de un fruto abierto; i) aquenio.