


1. **Plumbago** L.**

[Plumbágo f. – lat. *plumbago*, -inis = nombre de una planta; según Plinio, con hojas parecidas a las del lápató y que servía para curar cierta enfermedad de los ojos (lat. *plumbum*, -i). Algunos autores han querido ver en ella nuestra belesa]

Arbustos o hierbas perennes, a veces trepadoras. Hojas caulinares generalmente amplexicaules, auriculadas. Inflorescencia terminal espiciforme, ± densa.

** P. Galán Cela



Lám. 187.—*Plumbago europaea*, La Muela, Soria (MA 316298): a) parte inferior del tallo; b) rama florífera; c) inflorescencia; d) bráctea floral y detalle de los cilios; e) flor; f) sección longitudinal de una flor longistila; g) cálices fructíferos; h) fruto; i) sección del fruto mostrando la semilla.

1. **Plumbago**

Brácteas herbáceas. Cáliz tubular, con costillas anchas, herbáceas, glanduloso. Corola tubular acabada en cinco lóbulos patentes. Estambres 5, libres. Ovario súpero. Estilos 1, con 5 estigmas. Fruto seco, monospermo, dehiscente transversalmente cerca de la base, con parte caduca que se abre, de la base al ápice, a menudo en 5 valvas.

1. Flores de hasta 20 mm; hojas con glándulas en los márgenes 1. **P. europaea**
– Flores de más de 40 mm; hojas sin glándulas en los márgenes 2. **P. auriculata**

1. **P. europaea** L., Sp. Pl.: 151 (1753)

[europáea]

Ind. loc.: “Habitat in Europa australis”

IC.: Lám. 187

Planta perenne, herbácea o algo leñosa en la base. Tallos de hasta 100(120) cm, estriados. Hojas de hasta 10 × 3 cm, alternas, de forma variable, pecioladas; las inferiores, generalmente ovales u obovadas, cuneadas en el tercio inferior, amplexicaules, glandulosas en los márgenes y farináceo-puberulentas en el envés; las superiores, menores, lanceoladas, sésiles, cordadas en la base y con frecuencia glandulosas en ambas caras. Flores 3-bracteadas; bráctea inferior de hasta 5 mm; brácteas laterales c. 2,5 mm, iguales entre sí. Flores de hasta 20 mm. Cáliz de (5)5,5-8 mm, tubular, con glándulas estipitadas de c. 0,5 mm en los bordes de los sépalos, las que alcanzan hasta 1 mm en la fructificación dando al cáliz aspecto espinoso. Corola de longitud al menos doble que la del cáliz, tubuloso-infundibuliforme, de color azul, violeta o rosa, más intenso en los nervios medios de los lóbulos. Fruto oblongo-ovoide, oscuro, brillante. Semilla única, aguda por un extremo y redondeada por el otro. $2n = 12^*$, 14^* .

Lugares ruderalizados, pedreras, taludes, bordes de cultivos con evaporación intensa; 0-1000 m. VII-IX(X). Región mediterránea. Dispersa por casi toda la Península. **Esp.**: Ab Al Av (B) Ba (Ca) Cc (Co) CR Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu Na Or (P) Sa (Se) Sg So T Te (To) V Va Z Za. **Port.**: Ag TM. **N.v.**: belesa, hierba belesa, blesa, hierba blesa, dentalaria, dentelaria, hierba de San Antonio, matapeces, mata rabiosa, hierba del cáncer, tabaco de monte, palomillos de agua; *port.*: dentilária, erva-das-feridas, erva-de-santo-antonio; *cat.*: dentelària, malvesc, balbec, faverola.

2. **P. auriculata** Lam., Encycl. 2: 270 (1786)

[auriculáta]

Ind. loc.: “Croît dans les Indes orientales”

IC.: Curtis’s Bot. Mag. 48, tab. 2110 (1820)

Arbusto o planta trepadora. Hojas generalmente fasciculadas, ovadas o lanceoladas, obtusas, sin glándulas en los márgenes, farináceo-pubérulas en el envés; limbo decurrente, con dos aurículas redondeadas en la base. Cáliz 10-13 mm, glanduloso solo en su mitad superior. Corola infundibuliforme o rotácea, de color azul claro, aunque existen “cultivarietates” de flor blanca o roja. $2n = 14^*$, 16^* ; $n = 7^*$.

Oriunda de Sudáfrica e introducida como consecuencia de su cultivo en jardinería. Cunetas y lugares ruderalizados. Subespontánea en el S de España y muy probablemente también en Portugal. VI-IX(X). **Esp.**: [Ma]. **N.v.**: azulina, jazmín azul, celestina, malacara, plumbago; *cat.*: malvesc, llessamí blau.