

3. **Limoniastrum** Fabr.*

[Limoniástrum n. – gr. *leimónium*; lat. *limonium*, -i = nombre de una planta en Dioscórides y Plinio, que muchos autores han tomado por *Limonium vulgare*; lat. -astrum = sufijo que indica semejanza incompleta, inferioridad, etc.]

Arbustos. Ramas erectas o ascendentes, cubiertas de hojas en la parte superior y desnudas en la base, donde presentan cicatrices foliares. Hojas alternas, enteras, algo carnosas, con granulaciones blancas (depósitos de carbonatos). Flores pentámeras, en espículas uni o bifloras, dispuestas en inflorescencia espiciforme ramosa, terminal, muy frágil. Cáliz tubular, escarioso, con 5 dientes.

* E. Villanueva



Lám. 206.—*Limoniastrum monopetalum*, San Fernando, Cádiz (MA 238145): a) rama florífera; b) ramilla con flores; c) sección transversal de una espícula uniflora; d) sección transversal de una espícula biflora; e) espícula biflora; f) flor; g) sección longitudinal de una flor; h) sección transversal del ovario con el rudimento seminal; i) fruto.

3. *Limoniastrum*

Corola simpétala, rosada o violácea; tubo de longitud igual o mayor que la de los lóbulos. Estilos soldados en su mitad inferior. Fruto membranáceo, indehiscente, incluido en el cáliz.

Observaciones.—Según J. HOLUB [in Folia Geobot. Phytotax. Bohem. 5: 61-88 (1970); in Preslia 45(4): 356 (1973)] el nombre genérico no estaría válidamente publicado por Fabricius, al haberlo propuesto como simple designación unitaria de una especie; la autoría correspondería, en tal caso, a Moench, 1794.

1. *L. monopetalum* (L.) Boiss. in DC., [monopétalum]
Prodr. 12: 689 (1848)

Statice monopetala L., Sp. Pl. 1: 296 (1753) [basión.]
Ind. loc.: "Habitat in Sicilia"
lc.: Lám. 206

Arbusto o arbustillo de hasta 2 m, muy ramoso. Hojas (1,5)2-6(9) × 0,2-1(1,5) cm, de obovado-lanceoladas a lanceolado-espátuladas, que se ensanchan en la base para formar una vaina amplexicaule de 2-6 mm. Espículas tribracteadas. Brácteas coriáceas; la externa 4-6 mm; la media 2,5-7 mm; la interna 7,5-9 mm. Cáliz c. 9 mm, persistente, cubierto casi en su totalidad por la bráctea interna. Estambres 5(6), soldados por sus filamentos a la mitad superior del tubo de la corola. $2n = 72^*$.

En marismas, salinas, arenas y lugares pedregosos del litoral. III-XI. Región mediterránea. SW de la Península Ibérica y puntos aislados del litoral mediterráneo; cultivada como ornamental y localmente naturalizada. **Esp.**: [(A)] [Al] [B] [Ca] [H] [Ma] [PM] [(Mil)] [Se] [T]. **Port.**: [Ag] [BAI]. **N.v.**: salado, verdolaga seca; *cat.*: ajocagripaus.