

#### 4. Malope L.\*

[Malópe f. – gr. *malōpē* f.; lat. *malope*, -es f. = especie de malva cultivada, principalmente la malva común (*Malva sylvestris* L.)]

Hierbas anuales o perennes. Tallos erectos o ascendentes, glabros o pubescentes, sin pelos estrellados. Hojas enteras o con 3-5 lóbulos triangulares. Flores coloreadas o blanquecinas, solitarias, largamente pedunculadas. Epicáliz de 3 piezas libres ovado-cordiformes, más cortas y anchas que los segmentos del cáliz. Cáliz 5-lobado. Pétalos mucho más largos que el cáliz, obovados, de ápice truncado o redondeado y acuminado, generalmente de colores vivos. Carpelos numerosos, dispuestos en varios verticilos desiguales y que forman una cabezuela globosa; estigmas decurrentes, lineares. Fruto en esquizocarpo globoso; mericarpos indehiscentes, monospermos, rugosos o estriados, glabros.

*Observaciones.*—Se cultivan como ornamentales las 2 especies, particularmente *M. trifida* Cav.

*Bibliografía.*—E.G. BAKER in J. Bot. 28: 15-18 (1890).

1. Perenne; tallos hispídos, al menos en la parte superior; hojas más largas que anchas; estípulas hispídas; piezas del epicáliz hispídas en el dorso ..... **1. M. malacoides**  
 – Anual; tallos glabros; hojas casi tan largas como anchas; estípulas ciliadas; piezas del epicáliz glabras en el dorso, ciliadas ..... **2. M. trifida**

#### 1. *M. malacoides* L., Sp. Pl.: 692 (1753)

[Malacoídes]

*M. stipulacea* Cav. in Anales Ci. Nat. 3: 74 (1801)

*M. intermedia* Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 1: 110 (1888)


*M. malacoides* subsp. *stipulacea* (Cav.) Baker fil. in J. Bot. 28: 16 (1890)

*Ind. loc.*: "Habitat in Hetruriae pratis"

*Ic.*: Lám. 57

Hierba perenne. Tallos 10-50 cm, ramosos, densamente hispídos, al menos en la parte superior. Hojas basales 1,5-6(8) × 0,5-4 cm, de oblongo-ovadas a oblongo-lanceoladas, crenadas, trinervias, con pecíolo de longitud igual o mayor que la del limbo; las superiores, oblongo-lanceoladas, crenadas o a veces ligeramente trilobadas, con pecíolo hispído, más corto que el limbo; estípulas de lanceoladas a ovado-cordadas, acuminadas, enteras, hispídas. Flores con pedúnculos de longitud generalmente mayor que la de la hoja de la axila correspondiente, hispídos. Piezas del epicáliz 6-15 × 7-15 mm, ovado-subcordadas, acuminadas, hispídas en el dorso, más anchas que los sépalos pero 1,5-2,5 veces más cortas. Cáliz 13-20 mm, con los lóbulos triangular-lanceolados, agudos o ± obtusos. Pétalos

\* I. Nogueira & J. Paiva



Lám. 57.—*Malope malacoides*, Jerez de la Frontera, Cádiz (MA 177465): a) hábito; b) epicáliz y cáliz en visión lateral; c) sección longitudinal de una flor y detalle del tubo estaminal; d) sección longitudinal de un cáliz fructífero; e) mericarpos.

5. *Abutilon*

20-60 mm, obovados, truncado-emarginados, a veces acuminados, de un rosa intenso o purpúreos. Mericarpos 2-2,5 mm de diámetro, subglobosos, estriado-rugosos, de un castaño oscuro. Semillas que no ocupan completamente el lóculo del mericarpo, reniformes, de un castaño oscuro, glabras.  $2n = 44^*$ .

Campos de cultivo, pastos y bordes de caminos; 0-200 m. III-VII. S de Europa, NW de África y SW de Asia. Andalucía. **Esp.:** Ca (J) Se.

*Observaciones.*—Se conoce una antigua recolección etiquetada: “Sierra de Ávila, près El Escorial, III-1850, M. P. Graells 2322”. Sospechamos que la etiqueta fue trabucada o que la planta se colectó en cultivo.

Medicinal (emoliente, laxante) y comestible (hojas).

2. *M. trifida* Cav., Diss. 2: 85, tab. 27 fig. 2 (1786)

[trífida]

*M. malacoides* sensu Cadevall

*Ind. loc.:* “Habitat in pratis Baeticae prope Carmonam”

*lc.:* Cav., Diss. 2, tab. 27 fig. 2 (1786); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 320 (1987)

Hierba anual. Tallos 20-60(100) cm, simples o ramosos en la base, glabros, a veces esparcidamente escabros. Hojas basales (1)3-8 × 4-10 cm, de suborbiculares a ovadas, crenadas o serradas, 3-5-nervias, con pecíolo de longitud igual o menor que la del limbo; las superiores, ovadas, suborbiculares, 3-5-lobadas, crenadas o serradas; estípulas de lanceoladas a triangular-lanceoladas, acuminadas, ciliadas. Flores con pedúnculos de longitud mucho mayor que la de la hoja de la axila respectiva, con algunos pelos estrellados en su parte superior. Piezas del epicáliz 12-15 mm de diámetro, 1,5-2 veces más cortas que el cáliz, ovado-orbitulares, cordadas en la base, de agudas a subobtusas, glabras en el dorso, ciliadas, acrescentes en la fructificación, de hasta 30 mm. Cáliz 15-25 mm, con lóbulos triangular-lanceolados, agudos. Pétalos 30-60 mm, obovados, truncados o ± acuminados, de un rojo intenso, violáceos o purpúreos. Mericarpos 1,8-2 mm de diámetro, subglobosos, estriados, de un castaño pálido. Semillas que ocupan completamente el lóculo del mericarpo, reniformes, de un castaño oscuro, glabras.  $2n = 44, 50$ .

Campos incultos, baldíos, en suelos arcillosos; 0-100 m. IV-VI. NW de África. Cultivada por sus muy llamativas flores y ocasionalmente naturalizada o subespontánea en Europa y SW de Asia. SW de España, naturalizada localmente en Portugal. **Esp.:** [(B)] [Ca] [Co] [Gr] [Se] [(V)]. **Port.:** [E]. **N.v.:** malva de dehesa.