


8. Malvella Jaub. & Spach*

[Malvélla f. - lat. *malva*, -ae f. = malva; lat. -*ella*, -ae f. = sufijo de diminutivo]

Hierbas perennes. Tallos numerosos, difusos. Hojas cordadas o renifor-

* J. Paiva & I. Nogueira



Lám. 61—*Malvella sherardiana*, Cerro Negro, Madrid (MA 150875): a) hábito; b) detalle de una hoja; c) botón floral y detalle de su pilosidad; d) epicáliz y cáliz; e) flor; f) flor abierta; g) sección de una flor, que muestra los estambres y estigmas; h) pétalo; i) cáliz con esquizocarpo; j) esquizocarpo maduro; k) visiones lateral y dorsal de un mericarpo; l) semilla y detalle de su testa.

9. *Malva*

me-orbiculares; estípulas \pm lanceoladas, persistentes. Flores solitarias, axilares. Epicáliz de 3 piezas libres, muy pequeñas, setáceas. Cáliz campanulado, 5-lobado. Pétalos más largos que el cáliz, enteros, con uña corta, puberulentos en la cara inferior, amarillos o rosados. Carpelos numerosos, en un solo verticilo, cada uno con un rudimento seminal; estigmas decurrentes, alargados. Fruto en esquizocarpo discoideo; mericarpos (7)10-12(13), imbricados, monospermos, indehiscentes, inflados en la madurez, pubescentes. Semillas subreniformes.

Bibliografía.—A. KRAPOVICKAS in *Bonplandia* 3: 53-62 (1970); P.A. FRYXELL in *Southw. Naturalist* 19: 97-103 (1974).

1. ***M. sherardiana*** (L.) Jaub. & Spach, Ill. Pl. [Sherardiána]
Orient. 5: 47, tab. 444 (1855)

Malva sherardiana L., Sp. Pl. ed. 2: 1675 (1763) [basión.]

Malva cymbalariiolia auct.

Ind. loc.: "Habitat in Bithynia. Arduini"

lc.: Lám. 61

Tallos 10-50 cm, decumbentes o parcialmente ascendentes, simples o ramosos, muy hojosos, estrellado-pubescentes. Hojas (0,7)1-5 cm de diámetro, largamente pecioladas, cordado-orbiculares o reniformes, enteras, a veces ligeramente lobadas, crenadas, estrellado-pubescentes por las dos caras; peciolo inferiores más largos que el limbo, los superiores más cortos, estrellado-pubescentes; estípulas ovado-lanceoladas, casi escariosas. Flores desde la base de los tallos; pedúnculos más largos que las flores. Piezas del epicáliz 1-2 mm, setáceo-filiformes, más cortas que el cáliz. Sépalos (4)5-7 mm, ovados, estrellado-pubescentes, conniventes en la fructificación. Pétalos 9-10 mm, obovado-orbiculares, rosados, puberulentos en la cara inferior. Mericarpos obovoideos, irregularmente alveolados, densamente pubescentes. Semillas de color castaño o ferrugíneo oscuro, densamente verrucosas.

Arvense o ruderal, de sitios áridos; 200-1000 m. VI-IX. España, Bulgaria, Grecia y SW de Asia. **Esp.:** Co M.

Observaciones.—De las cuatro especies que integran el género ésta es la única europea; las tres restantes, americanas.