

LXI. ULMACEAE *

Árboles o arbustos. Hojas alternas, simples, asimétricas en la base –el limbo, en su parte proximal, recorre una porción mayor de pecíolo que en su parte distal, dando lugar a la formación del lóbulo basal–, con estípulas caedizas. Flores unisexuales o hermafroditas, inconspicuas, solitarias o en glomérulos en la parte terminal de las ramillas. Perianto con una sola envuelta (cáliz), de 3-9 segmentos (sépalos). Estambres en número igual al de segmentos perianticos y opuestos a ellos. Ovario súpero –rudimentario en las flores masculinas–; carpelos 2, uniloculares. Estilos 2, arqueados y con los estigmas decurrentes situados en su cara interna. Fruto en sámara, drupa o nuez, con una sola semilla.

Integrada por 16 géneros y c. 2000 especies, que se distribuyen por las regiones tropicales, subtropicales y templadas del Hemisferio Norte.

1. Flores en glomérulos, todas hermafroditas; fruto en sámara; corteza del tronco de color pardo oscuro y muy claramente agrietada; hojas con nervadura claramente pinada **Ulmus**
- Flores solitarias o raramente en grupos de 2-3, unas hermafroditas y otras masculinas; fruto en drupa; corteza del tronco grisácea y con muy escasas grietas; hojas ± trinervias en la base **Celtis**

*C. Navarro & S. Castroviejo (eds.)