

2. *Parietaria* L.*

[Parietária f. – lat. *parietaria*, -ae f. = plantas que crecen en los muros viejos (lat. *paries*, -etis m. = muro, pared), principalmente la *parietaria* (*Parietaria* sp.)]

Hierbas anuales o perennes, a veces leñosas en la base, generalmente pubescentes, sin pelos urticantes. Hojas alternas, pecioladas, enteras, con 3 nervios basales; sin estípulas. Inflorescencias polígamas en cimas condensadas o en fascículos axilares, de 3-8(10) flores, cortamente pediceladas, braceadas. Flores hermafroditas y masculinas con perianto 3-4-partido; estambres 3-4; ovario rudimentario. Flores femeninas con perianto tubular, cortamente 3-4-lobado; ovario elipsoide, estigma sésil o en un estilo corto, linear o densamente penicilado. Aquenios ovoideo-comprimidos, incluidos en el perianto persistente.

Bibliografía.—J. MENNEMA in *Gorteria* 3: 96-102 (1967); C.C. TOWNSEND in *Watsonia* 6(6): 365-370 (1968); M. RAFFAELLI in *Webbia* 31: 49-68 (1977); J. CHRTEK in *Folia Geobot. Phytotax.* 8: 425-427 (1973).

- 1. Perenne; densamente pubescente; aquenios negruzcos **1. *P. judaica***
- Anual; laxamente pubescente; aquenios de color verde aceituna o marrón 2
- 2. Perianto fructífero 2-3 mm, más largo que las brácteas; flores hermafroditas numerosas; hojas acuminadas **2. *P. mauritanica***
- Perianto fructífero 1,5-1,75 mm, tan largo o más corto que las brácteas; flores hermafroditas escasas; hojas cortamente acuminadas **3. *P. lusitanica***

Subgen. I. ***Parietaria***

Hierbas perennes, leñosas en la base, ocasionalmente anuales, con pelos simples o capitado-glandulosos. Flores inferiores de las inflorescencias femeninas, y las superiores, hermafroditas, o todas hermafroditas.

* J. Paiva

2. *Parietaria*1. *P. judaica* L., Fl. Palaest.: 32 (1756)

[judáica]

P. punctata Willd., Sp. Pl. 4(2): 953 (1806)*Ind. loc.*: "Palaestina"*lc.*: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 157 (1987)

Hierba perenne, de base leñosa, ascendente o procumbente. Tallos 15-80(100) cm, muy ramosos, densamente pubescentes. Hojas 1-5(7) × 0,5-3(3,5) cm, ovado-lanceoladas u oblongo-lanceoladas, agudas, cuneadas en la base, ± pubescentes o glabrescentes. Flores en fascículos axilares, con un número variable de flores; brácteas c. 2 mm, ovado-lanceoladas o elípticas, ± soldadas en la base, pubescentes. Flores hermafroditas numerosas, con perianto generalmente tubular, acrescente, de hasta 3-3,5 mm en la fructificación, con indumento de pelos delgados, a veces uncinados; las femeninas, escasas, con perianto de 2-2,5 mm, lóbulos lanceolados, agudos, conniventes y densamente pubescentes. Aquenios de 1-1,3 mm, ovoideos, negruzcos, brillantes. $2n = 26$.

Principalmente en los muros, ruderal y viaria; suelos nitrificados; 0-1500 m. III-X. SW de Asia, S y W de Europa y región mediterránea. Introducida en el N de América. Península Ibérica e Islas Baleares. (**And.**) **Esp.**: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or PM[Mll Mn Ib Formentera Cabrera] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. **Port.**: todas las provincias. **N.v.**: paletaria, hierba del muro, albahaquilla de muro, albahaca de río, albahaquilla de culebra, albahaquilla loca, albahaquilla, ortiguilla muerta, pelosilla, hierba caracolera, caracolera a secas, carqueruela, hierba de San Pedro, cañarroya, beletón, hierba de las ruinas; *port.*: parietária, pulitária, alfavaca-de-cobra, alfavaca-de-cova, urtiga-mansa, erva-de-nossa-senhora, erva-das-muralhas, erva-dos-muros; *cat.*: morella roquera, parietària, herba de paret, herba de mur, rocamorella, morellosa, herba roquera, herba apegalosa, herba de la Mare de Déu, herba de Nostra Dama, herba de Sant Pere, herba caragolera, caragolera, herba de cargol, maia, cama roja, granadella; *eusk.*: ormabelarr, odar, odol belarr, odol belharr, zigu, andredena, Maria belarr, muru belarr; *gall.*: palitaria, herba das paredes, herba fura paredes, colerinha, pulitaina, paletaina, paleiro.

Observaciones.—Esta especie ha sido confundida con *P. officinalis* L., que no crece en la Península. *P. judaica* L. se distingue de *P. officinalis* L. por ser una hierba procumbente o ascendente, con hojas de hasta 5(7) cm de longitud y con perianto tubular de hasta 3-3,5 mm en la fructificación; *P. officinalis* L. es una planta erecta, con hojas de hasta 12 cm de longitud y con perianto campanulado, de hasta 2,75-3 mm en la fructificación.

Planta utilizada como diurética, para tratamiento de enfermedades del aparato urinario y contra las infecciones de las vías respiratorias. Su polen, como el de las otras especies del género, es alérgico.

Subgen. II. *Freirea* (Gaud.-Beaup.) Komarov

Hierbas anuales, con pelos simples o glandulosos y capitados. Flores basales de las inflorescencias, hermafroditas; las superiores femeninas u, ocasionalmente, todas las flores femeninas.

2. *P. mauritanica* Durieu in Rev. Bot. Recueil

[maurítanica]

Mens. 2: 427 (1847)

Ind. loc.: "Cette Pariétaire, assez commune à Alger, se retrouve à Oran et jusqu'à Tlemcen; elle s'éloigne peu du littoral et paraît manquer dans l'est de l'Algérie"*lc.*: Jahfiri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Libya 47: 6 fig. 2 d-f (1977); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 157 (1987)

Hierba anual, procumbente o erecta. Tallos 10-40(50) cm, generalmente ramificados desde la base, escasamente pubescentes. Hojas (1)2-8 × 1-6 cm, ovadas o suborbiculares, claramente acuminadas, redondeadas o ± cuneadas en la base, esparcidamente pubescentes; pecíolo tan largo o más que el limbo. Flores 10-30, en cimas fasciculadas, axilares, pedunculadas, con más flores hermafroditas que femeninas; brácteas más cortas que el perianto, las de las flores hermafroditas ovadas, libres, ciliadas; las de las flores femeninas, lanceoladas. Flores hermafroditas blanquecino-rojizas, con perianto de 2-3 mm, 4-partido, pubescente y ciliado; perianto de las flores femeninas de c. 2 mm, con los lóbulos conniventes en la fructificación. Aquenios 1-1,5 mm, ovoideos, de color verde aceituna o marrón.

Paredes, rocas, fisuras, ruderal; 0-700 m. III-V. NW de África y SW de Europa. C, SE y S de la Península Ibérica, Islas Baleares. **Esp.:** (Ab) Al Ba Ca Cc Gr (H) J Ma Mu PM[Mil Mn Formentera] Se V (Za). **Port.:** AAl BB DL E. N.v.: parietaria de hoja ancha; *cat.:* morella mauritànica.

3. *P. lusitanica* L., Sp. Pl.: 1052 (1753)

[lusitánica]

subsp. *lusitanica*

Ind. loc.: "Habitat in Lusitania, Hispania"

lc.: Lám. 75

Hierba anual, procumbente o erecta. Tallos 10-30 cm, delgados, escasamente pubescentes. Hojas (0,5)1,5-2(2,5) × 0,5-1,2(2) cm, ovadas, suborbiculares u ovado-romboidales, cortamente acuminadas, redondeadas o atenuadas en la base, esparcidamente pubescentes; pecíolo más corto que el limbo y más largo que las inflorescencias. Flores 3-7(8), en fascículos axilares, subsésiles; brácteas de las flores hermafroditas, linear-lanceoladas, libres, pubescentes o ciliadas; las de las flores femeninas, lanceoladas, libres, pubescentes o ciliadas, tan largas o más cortas que el perianto. Flores hermafroditas escasas y generalmente estériles, dispuestas en la base de las inflorescencias; las femeninas, en la parte superior y fértiles. Perianto de las flores femeninas 1,5-1,75 mm, 4-partido, inconspicuamente acrescente, de lóbulos ovados, subagudos, con escasos pelos ganchudos y pelos rectos. Aquenios de 1 mm, ovoideos o elipsoideos, de color verde aceituna o marrón. $2n = 16(20)$.

Paredes, rocas, fisuras, ruderal, etc.; 0-500 m. V-VII. Región mediterránea y SW de Asia. Península Ibérica, excepto el NE y el SW, Islas Baleares. **Esp.:** A Al Av Ba (Ca) Cc Cs Ge Gr (Mu) O Or PM[Mil Mn (Ib) Cabrera] Sa (T) Te To V Za. **Port.:** BA BL TM.

Observaciones.—La subsp. *serbica* (Pančić) P.W. Ball, del SE de Europa, se distingue de la subespecie típica por tener el limbo foliar 2-4 cm de longitud y el pecíolo tan largo como él, mientras que en la subsp. *lusitanica* el limbo no excede, generalmente, 2(2,5) cm y el pecíolo es más corto que él.