

3. Soleirolia Gaudich.*

[Soleirólia f. – Joseph François Soleirol (1781-1863), botánico aficionado y recolector corso]

Hierbas perennes, pubescentes, sin pelos urticantes. Tallos muy delgados, difusos, procumbentes. Hojas alternas, pecioladas, enteras, sin estípulas. Flores

* S. Ortiz

4. *Forsskaolea*

unisexuales, axilares, solitarias, de sésiles a cortamente pediceladas. Flores masculinas con un involucre de 3 brácteas estrechas, libres hasta su base, perianto campanulado, 4-lobado de hasta la mitad de su longitud, estambres 4. Flores femeninas con un involucre de 3 brácteas, aquilladas en el dorso, gibosas en la madurez, \pm connadas en un tubo que rodea al perianto, tubular, cortamente 4-lobado; ovario con un rudimento seminal, estilo corto y estigma penicilado. Aquenios ovoideos, incluidos en el perianto y en las brácteas del involucre.

Bibliografía.—H. WEDDELL in Arch. Mus. Hist. Nat. 9: 529-531 tab. 18 fig. a (1856); A. ENGLER, in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3, 1: 116 fig. 84 d (1889).

1. *S. soleirolii* (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965) [Soleirólíi]


Helxine soleirolii Req. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 384 (1825) [basión.]

Ind. loc.: "... à Cervione, dans un lieu ombragé, contre une muraille où elle forme des gazons très-fourmis. Elle croît aussi au cap Corse"

lc.: Lám. 76

Tallos 2-20 cm. Hojas (1)3-4(7) mm, alternas, pero en muchos casos subopuestas, reniforme-orbiculares, cortamente pecioladas, con la base oblicua, trinerviadas, haz con pelos cortos, dispersos, y cistolitos alargados, conspicuos, envés con pilosidad escasa en los nervios, sin cistolitos. Flores masculinas con pedicelo de 0,4-0,7 mm, brácteas del involucre 0,7-1 mm, perianto 1-1,3 mm, filamentos de hasta 1,5 mm y anteras 0,5 mm; flores femeninas con pedicelo de hasta 0,2 mm, brácteas del involucre (0,7)1-1,5(2) mm, acuminadas, ciliadas apicalmente, con pelos uncinados en la quilla y giba de 0,1-0,7 mm en la madurez; perianto 0,5-0,8 mm. Aquenios 0,7-1,1 mm, incluidos en el perigonio. $2n = 20$.

Entradas de cuevas, taludes, roquedos extraplomados, etc.; 50-700 m. III-VIII. Oriunda de las islas del Mediterráneo occidental (Córcega, Cerdeña, Capraia y Mallorca); naturalizada, principalmente como consecuencia de su cultivo como ornamental, en Italia peninsular, Península Ibérica, Macaronesia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Holanda. Islas Baleares (Mallorca). **Esp.:** [(B)] [C] [Ca] [Or] PM[MII] [Po] [(SS)]. **Port.:** [BL] [DL] [E].



ESR/91

Lám. 76.—*Soleirolia soleirolii*, Coimbra, Beira Litoral (MA 490416): a) hábito; b) ramilla con flor masculina y flor femenina; c) ramilla con una flor masculina; d) flor masculina en versión inferior, mostrando involucre; e) semilla con flor femenina en visión lateral; f) semilla con flor femenina fructificada; g) flor femenina; h) estigma; i) aquenio.