

## 2. *Cleome* L.\*

[Cleóme f. – lat. tardío *cleome* = según Linneo, en “Octavum Horatium”, una hierba parecida a la *sinapis*. Autores prelinneanos, como Barrelier, Burmannus, Dillenius o Martyn, incluyeron entre los *Sinapistrum* plantas que Linneo consideró de su género *Cleome*]

Hierbas anuales o perennes –algunas especies extraibéricas arbustivas–, pubescente-glandulosas. Hojas de pecioladas a sésiles, indivisas o 3-9 digitadas, sin estípulas. Flores más o menos zigomorfas, dispuestas en racimos terminales. Sépalos 4, libres o casi. Pétalos 4, sésiles o unguiculados, dimorfos. Estambres de 2 a numerosos, iguales o desiguales. Ovario sésil o sobre un corto ginóforo, unilocular, cilíndrico, con numerosos rudimentos seminales, estilo corto o nulo. Fruto en cápsula silicuiforme, dehiscente por 2 valvas, a veces sobre un alargado ginóforo (estipe). Semillas subgloboso-reniformes, glabras o pubescentes.


### 1. *C. violacea* L., Sp. Pl.: 672 (1753)

[violácea]

*Ind. loc.*: “Habitat in Lusitania”

*Ic.*: Lám. 143

\* N. Marcos Samaniego & J. Paiva



Lám. 143.—*Cleome violacea*, Zorita, Badajoz (GDA 1260): a) hábito; b) ramilla con flor y detalle del margen de una bráctea; c) flor con solo estambres de filamento corto; d) estambre con filamentosos cortos y largo; e) ramilla con cápsula; f) detalle de una cápsula abierta en sección transversal; g) detalle de la parte basal de una cápsula en sección transversal; h) semilla. Entre Álora y Carratraca, Málaga (MA 329166): i) hábito.

2. *Cleome*

Hierba anual. Tallos 9-60 cm, erectos, ramosos. Hojas inferiores pecioladas, trifoliadas; las superiores, sésiles o subsésiles, simples; folíolos (5)10-40 × (1)2-6 mm, lanceolados, oblongo-lanceolados o lineares. Racimos terminales, laxos; brácteas de longitud igual o superior a la de los pedicelos; pedicelos 4-8 mm. Sépalos 3 mm, agudos. Pétalos violáceos, raras veces amarillos y punteados de violáceo, desiguales; los 2 superiores (3)4-6 mm, obovados, cortamente unguiculados; los 2 inferiores 3,5-5 mm, suborbicular-ovados o cordado-ovados, contraídos en uña de longitud 1/3-1/2 la del limbo. Estambres con filamentos de longitud desigual; anteras purpúreas. Cápsula (4)5-11 × (0,1)0,2 cm, péndula, cilíndrico-comprimida, con pubescencia glandulosa. Semillas densamente papilosas.  $2n = 18$ .

En terrenos pedregosos o arenosos, cultivados o en barbecho; 0-1400 m. IV-X. N de África y Península Ibérica. Principalmente W y S de la Península. **Esp.:** Al Ba Cc Co CR Gr H J Le Lu Ma Or Sa Se T. **Port.:** AAl Ag BA BAl BL E R TM. **N.v.:** trébol amostazado de Portugal, mostaza loca.